

蜂蟹蟎防治關鍵時機：採蜜後施藥效果佳又安全

文、圖/徐培修

蜂蟹蟎是全年都可能發生的蜜蜂外寄生蟎，傳播途徑多元，潛藏蜂房難以完全防堵，若夏季疏於管理，極易導致秋冬季的蜂蟹蟎族群大發生，進而使蜂群衰弱甚至滅群。本場提醒蜂農，在春蜜採收後，應把握防治黃金時期進行化學藥劑防治，才能有效控制蟎害。

蜂蟹蟎的最佳防治時機包括：蜜蜂春繁前、採蜜後、秋繁前及入冬前。其中，採蜜後為防治效果最理想的時機。若採蜜時採用關王或換王方式操作，採收後蜂箱內無封蓋子脾，蜂蟹蟎難以藏匿，藥劑易於接觸蟎體，防治效果顯著。此外，此時蜂蜜已採收完成，暫無藥物殘留顧慮，可安心施藥。


目前推薦用於蜂蟹蟎防治的藥劑包括福化利與百里酚，使用時應遵循推薦方法才能達到最佳效果。

福化利應稀釋5倍（福化利+水

=1:4混合），以壓舌板浸泡3日後陰乾，再懸掛於巢脾之間使用。百里酚則須注意炎熱時應減量使用避免藥害，推薦劑量為每箱25公克，建議夏季每脾蜂用量改為1公克即可，並留意在缺蜜期間可能引起盜蜂，建議加強餵飼以減少此情形。

不論使用何種藥劑，防治期程

應連續進行3週，並每週更換或補充藥劑，以維持有效濃度，全蜂場同步施作更能提升防治成效，每個防治期程應輪替使用不同藥劑減少抗藥性產生。唯有落實正確用藥管理，才能有效抑制蜂蟹蟎，確保蜂群健康與蜂產品品質。



蜂蟹蟎周年防治計畫。