

苗栗地區臺灣香檬有機栽培技術要點

文、圖/任心怡、張凱傑、邱怡萍

臺灣香檬 (*Citrus depressa*) 為臺灣原生柑橘，適合排水良好的丘陵地栽培。香檬開花期早自2月中旬開始，果實於8月果皮仍呈綠色時採收，香氣清香、風味濃郁，是豐富柑橘市場的多元選擇。有機果園栽培管理上可從環境、開花期及採收期與病蟲害防治為管理方向：

栽培環境

香檬適合日照充足、排水良好的丘陵地栽培，草生栽培維持土壤濕度、促進土壤有機質累積。樹勢中庸，修剪以通風採光為原則，可降低病蟲害發生並促進新梢生長。

開花期及採收期

香檬開花期自2月中旬至3月上旬，較其他柑橘早開花。開花期保

持果園土壤水分，避免乾旱造成落花。早春花期可為蜜蜂、食蚜蠅及瓢蟲等授粉與天敵昆蟲提供花粉資源，促進果園生物多樣性。果實約於8月果皮仍呈綠色時採收，為風味最佳時期。

常見病蟲害與防治

有機栽培中以天牛、介殼蟲與煤煙病最常見。天牛危害樹體導致乾枯受損，應定期巡查及包覆沙網之隔



採收期臺灣香檬果實。

離；介殼蟲吸汁易引發煤煙病，須保持樹冠通風與日照。

臺灣香檬於苗栗地區可發展有機栽培並良好適應性與發展潛力，兼顧生產及生態，展現永續果園經營。



臺灣香檬有機果園草生栽培。