

瓜、果實蠅田間管理要點

文圖 / 于逸知

東方果實蠅與瓜實蠅為重要之作物害蟲，前者危害多數經濟果樹，後者主要危害葫蘆科作物，每年皆造成農產品嚴重的經濟損失。為避免實蠅類為害，建議農友於田間防治管理應把握以下重點：

一、落實田間衛生管理：

要降低實蠅類危害，首要關鍵是維持田間衛生。實蠅類幼蟲為害果(瓜)實，成熟後會鑽出並躲藏至地面縫隙化蛹，再羽化成蠅，反覆於田間為害。因此淘汰的受害果切勿掛留或堆棄於地面、溝渠，一定要儘快移除；或於田間設置多個「加蓋棄置桶」，集中棄果再定期清理。

二、正確使用誘引資材：

正確、長期吊掛甲基丁香油(誘殺果實蠅專用)或克蠅香(可同時誘殺瓜、果實蠅)陷阱，可監測害蟲田間密

度，並降低族群數量；另外黃色黏紙、噴膠、酵母球陷阱等亦可有效誘殺實蠅類害蟲。以上資材須定期更換。


三、物理阻隔是最佳保護：

「套袋」是最有效的防治方法，惟不同作物的套袋時機應掌握。套袋前應先做好病蟲害管理，袋口需紮緊，莫使用劣質套袋。若搭配設施栽培則更加理想，但應注意設施防蟲結構之完備並落實出入口管控，避免害蟲趁機入侵。

四、切勿僅依賴噴藥防治：

瓜、果實蠅平時躲藏於田區周邊雜林等陰涼處，產卵時才會到田

區為害，故僅倚賴噴藥將無法達到良好防治效果，惟落實上述各防治重點才能有效避免作物受害。



▲ 瓜、果實蠅幼蟲會於棄果內生長，並鑽入土中化蛹，羽化後會持續於田區為害(圖為AI生成)



▲ 實蠅類平時會躲藏於周邊雜林，除田區噴藥防治外，更應加強環境衛生管理



▲ 田間棄果會變成實蠅類害蟲孳生的溫床



▲ 降低瓜、果實蠅密度作法，田間設置「加蓋棄置桶」，方便隨時清除廢棄果，可有效避免瓜、果實蠅滋生(圖為AI生成)