

掌握時機培養荔枝龍眼翌年結果（母）枝

文圖 / 李昱錡

荔枝、龍眼採收後的修剪，是影響翌年順利開花與結果的重要管理工作。採後修剪主要目的在於調整樹冠結構，促進新梢萌發（吐紅），及培養 2-3 次健壯且成熟的枝梢。這些枝條及其成熟葉片具有良好光合能力，可累積並供應花序與果實發育所需養分，是重要的「養分供應來源 (source)」。因此，採收後應依植株樹勢儘早進行適度修剪，為下一季生產做好準備。

修剪時機以採收後儘早進行為原則，荔枝約於 7 月、龍眼約於 8 月採收後即可修剪，並以 9 月上旬（白露前）完成為宜，使新梢具有足夠時間接續生長 2-3 次，並於 11 月下旬（小雪前）充分成熟。生長勢強的植株可採「中剪」，將枝條回剪至第 1 次梢附近，修剪量約 50%，適度保留葉片帶動樹體水分運移並促進新梢萌發；但應避免過度修剪，尤其不宜一次去除 75% 以上枝葉，以免新梢萌發緩慢，延後葉片成熟期，影響後續感應涼溫誘導開花。

對於生長勢較弱的品種，例如糯米糍荔枝，則宜採「弱剪」，盡量保留至第 2 次梢，整體修剪量約 25%，維持植株葉面積及養分累積量，避免修剪過重造成樹勢衰弱，導致新梢生長緩慢或萌發數量不足。若樹冠內部枝條過密、受光不足，可由枝條基部適度疏刪弱枝、交叉枝及過密枝，以改善通風與日照。與當年結果枝同時生長但未結果的枝條，若已形成 2-3 次健壯枝梢，且位置及空間適當，則可予以保留，作為後續開花結果的重要枝梢。

採後修剪並非「剪得越多越好」，當年生長 2-3 次且已充分成熟的枝梢，具有較佳的葉片功能及養分累積量，是後續開花與結果的重要基礎。掌握採後修剪適期，適度保留健壯枝梢並改善樹冠結構，提早培養充實的結果（母）枝，才能為下一季穩定抽花、著果及維持產量奠定良好基礎。



▲ 荔枝、龍眼採收後修剪枝條時，保留葉片促進新梢萌發（吐紅）



▲ 糯米糍荔枝採收後修剪，當年生枝條接續生長 3 次枝梢