


豉豆

合理的養豬法



其慢慢變化。第二、飼料應儘量給以容易消化吸收的形態。例如大豆粕，玉蜀黍那樣堅硬的飼料，若不粉碎或不充分浸水，則不易被吸

收	入	支	出
成豬賣出所得額	三、六〇〇元(每頭一〇〇公斤六頭分)	小(仔)豬購入費	七二〇元
堆肥估價額	一、五六三元二角	飼料費	一、六九六元
計	五、一六三元二角	計	三、四一六元

註：一〇骨粉：三

離乳後期間	體	電	大豆粕	生甘藷	甘藷莖	一米	糠	鹽骨粉
一・二個月	一〇〇	〇	二・五	一・五	〇	二・五	〇	〇
二・三個月	二〇三	〇	四・五	二・〇	〇	五・五	〇	〇
三・四個月	三二四	〇	五・五	二・五	〇	六・〇	〇	〇
四・五個月	四五一	〇	六・〇	三・〇	〇	七・〇	〇	〇
五・六個月	六〇一	〇	六・〇	三・〇	〇	八・〇	〇	〇
六個月	八〇一	〇	六・五	六・〇	三・〇	八・〇	〇	〇

的大豆粕，但這些是輸入品。可惜本省出產大豆不多，但本省却出產多量而優秀的蛋白質飼料，這就是落花生。落花生粕的效果，雖稍劣於大豆粕，但它是優秀的養豬飼料。餵十二斤的落花生粕與餵十斤的大豆粕，其效果是相同的。

此外，當餵飼料的時候，關於食物的消化，應該考慮下列二點：第一、飼料不可使其急遽變化，應使

收而會排泄體外的。

假定於一年內以出賣為目的飼育六頭豬，那麼，究竟需要多少費用？或有多少利益？這就是普通的農民而言，他們因能够給自足飼育豬，所以除得到出賣的豬六頭外，並且田園也能夠施用堆肥，這正是一舉兩得。飼育飼料配合表及收支對照表，請參看左表。

依照左表，我們可以知道豬六頭


一、養豬飼料配合表（每頭每日飼給量）

法賣出。可是在大家競賣的情形下，價錢不免要吃虧，假使能够多貯藏一個時期，待市面價錢好一點的時候再出售，對於農家不是更有利嗎？

這裡介紹貯藏甘薯的七個要點，以供大家參攷：

一 貯藏倉舍須消毒乾淨 甘薯

的賣出價格，只得三、六〇〇元而已。但若把副產物的堆肥計算在內時，則其利益是很大的。過去本省農民都忽略了這貴重的堆肥利用價值，今後應該特別注意這一點。但在都市飼養豬的時候，並沒有堆肥的利用價值，所以收入額僅僅是三、六〇〇元，而純利益也只是八四元而已。



內箱板條在裝分薯甘

放進倉舍以前，倉內所有殘留或已腐爛的甘藷同其他垃圾，必須完全清除，地上打掃乾淨，然後倉內全部施行消毒。消毒的時候可用硫酸銅藥水（比例爲廿五加侖清水放進一磅硫酸銅粉），遍灑倉內牆壁地上各部，如果買不到硫酸銅粉，用石灰水亦可。所有盛放過甘藷的箱具也要灑遍。

二 甘藷應在霜降以前收成以免

寒凍，如氣候降至華氏表五十度以下，甘薯則容易凍傷。最好當薯葉開始轉黃的時候，甘薯則可收成。掘取甘薯應儘可能選擇土地乾燥氣候溫和的日子。

三、收成的時候應極力避免使甘薯受到任何創傷。甘薯表皮很薄，容易破裂。因此採掘、收取、置放、收倉的時候，要極力避免碰撞損傷。甘薯的表皮正和人體的皮膚一樣，若保持完好，可以防止細菌侵入內部造成病害。採掘甘薯的時候，最好採用面積寬大的犁具，深深插入土中，從甘薯下面托起，這樣可以避免傷及薯體。甘薯掘出後，切莫扔丟，因為這樣也會使它受傷呢。

四、受傷或有爛點的甘薯切勿收倉。甘薯掘起後如有泥土附着，可以讓它在陽光下曬一兩個鐘頭，等乾了以後才收起。不過夏天陽光太厲害，甘薯是經不起灼熱的陽光曬的。所以在熱天的時候，甘薯收起的尚未入倉以前，上面最好用薯藤掩蓋完密，以免被陽光灼傷。甘薯碰傷或有爛點是難免的事。收倉以前須仔細檢視，若發現有毛病就趕快分開另放，不可跟好的混在一起。

八月是黃麻的採種期。黃麻開花後過五十天即可完熟。採種時，應在全園場中選擇具有品種特徵生育良好而且分枝較少的母本，切去頭部，充分乾燥之，以棒類或槌枷等輕輕打擊之，使種子自蒴中分離而調製之，施以短期間之日曬後，貯藏于冷涼之地，若能密閉貯藏更為妥當。

黃麻品種中時而混有早期分枝的系統。此種系統產種雖多，纖維却短，收量亦少。若與之一同採種，則將繁殖許多不良系統的種子。徒

時期空氣濕度仍保持百分之八十五，溫度則減至華氏五十度左右。通氣洞的啓閉可以調節溫度和濕度，譬如倉內溫度過高，那麼晚上可以把氣窗打開，如天氣太冷，上下氣窗應緊閉。倉內水氣凝結，則證明濕度過高，應打開門窗讓空氣流通，可以降低濕度。若室外天氣乾燥得快，生一點爐火可以使倉內乾以上各點如能儘量做到，相信農胞每年甘薯貯藏時的損失，可以減至最低限度。

耕地的生產力。至於氮化鈣所含氮素的肥效，在以往十幾年的試驗比較和間施，用如施用得合理，是要勝過硫酸銨。但如果對於硫酸銨的施用方法不適當的時候，恐對人體或農作物有害。事實上，氮化鈣的施用，而且可以完全發揮它的肥效。用時用手來施用，不可以飲酒，立即洗淨腳，手，面部等裸露的皮膚。

二、氮化鈣施用量，每公頃需一五〇—三〇〇斤，（即每市畝二〇—四〇市斤）；可以油餅或人糞尿等相互換用。每斤氮化鈣約合油餅三斤至五斤，人糞四〇—一〇〇斤，乾糞一〇—一五斤；但是不可以完全代替農家肥料，換言之，農家肥料須盡量應用。

三、氮化鈣原則上最好是用在基肥，同樣，也可用於甘藷。四、氮化鈣必須先與五倍的乾燥細土混和，即施後不立或與硫酸銨混過五、對於整地之前，先排水，再

氮化鈣肥料 150-300

一公頃

氮化鈣肥料 20-40

一市畝

