



# 猪瘟·猪丹毒防治法

### 一、猪瘟猪丹毒主要病狀


猪瘟的潜伏期約七日，至十二日，發病起初少或食慾廢絕，發熱為攝氏四十一至四十二度，精神萎靡，常鑽入褥內。初便，末期瀉痢，有膿狀分泌物。胸腹部有時發紅紫色的斑點，大致經過四、五天或十多天就瘦弱而死。

### 猪丹毒

初期，食慾減少，體溫四〇·四度，腹部發硬，腹瀉，眼膜發炎，腹部腫脹，脫落，關節腫脹，心跳，末期，因心臟衰弱，呼吸迫促，肺浮腫，結膜青紫，至第三、四日，體溫下降，最急性者，而死亡，四小時內死亡。

### 原因

侵入猪體，由病菌侵入，病菌在體內繁殖，侵入血液，引起全身性感染。因不注意衛生，平時不注意消毒，因不注意衛生，平時不注意消毒，因不注意衛生，平時不注意消毒。



獸醫對猪隻打預防針情形

### 甲、平時防疫

1. 畜舍要通風乾燥，向東南，應注意通風透光。  
2. 猪舍內外和用具，要時常保持清潔，禁止閒人進入或飛禽走獸接近。  
3. 時常注意猪的飲食，糞便，行動有無異常。  
4. 猪隻不可從有瘟疫的區域買進。新買的猪隻應隔離飼養一、二星期以後，才可與舊有家畜同飼。

### 乙、緊急防治

1. 趕快報告區鄉鎮公所派人來防治。  
2. 趕快報告區鄉鎮公所派人來防治。  
3. 趕快報告區鄉鎮公所派人來防治。

### 丙、預防勝於治療

猪丹毒，很少能醫好的。打猪丹毒疫苗，多少有效，但費用高而不能令人滿意。在未病以前注射結晶紫，能預防猪丹毒。結晶紫，是農林廳淡水獸醫血清製成，所以製成結晶紫，其效特別強大，定價低廉，注射一次即可保證免疫十個月。

### 丁、預防勝於治療

1. 增加稻麥穀實的重量。  
2. 增強一般農作物對病菌害的抵抗力。  
3. 促進根莖類的生長和成熟。  
4. 使水稻的分蘗多。

### 施用方法

一、在普通的水田，燂燂後，可以用作基肥；撒佈到田面，混和。每公頃的施用量為二百到二百五十公斤，但在十分缺乏磷素的地區，可以增加到三百公斤。

### 燂燂肥料的施用和效果

燂燂肥料，是磷質肥料，其效果顯著。施用燂燂肥料，可以增加土壤的磷質，促進植物的生長。燂燂肥料，是磷質肥料，其效果顯著。施用燂燂肥料，可以增加土壤的磷質，促進植物的生長。

### 燂燂肥料

燂燂肥料，是磷質肥料，其效果顯著。施用燂燂肥料，可以增加土壤的磷質，促進植物的生長。燂燂肥料，是磷質肥料，其效果顯著。施用燂燂肥料，可以增加土壤的磷質，促進植物的生長。

### 東臺灣的鏢槍漁業

鏢槍漁業，是東臺灣的一種傳統漁業。鏢槍漁業，是東臺灣的一種傳統漁業。鏢槍漁業，是東臺灣的一種傳統漁業。鏢槍漁業，是東臺灣的一種傳統漁業。

### 鏢槍漁業

鏢槍漁業，是東臺灣的一種傳統漁業。鏢槍漁業，是東臺灣的一種傳統漁業。鏢槍漁業，是東臺灣的一種傳統漁業。鏢槍漁業，是東臺灣的一種傳統漁業。



鏢槍漁民用叉捕魚的旗魚