



螺地方，水田養魚非常盛行，其面積現在已達十甲以上。魚種是吳郭魚。茲將該地篤農家廖萬來先生（前西螺鎮長）的水田養魚經驗談，介紹如下：

一、對於水田的必
要施設 廖先生的
養魚水田面積約有

一甲，水田周圍挖掘寬五尺，深一尺八寸的水溝，將所挖的泥土築造高四尺的堤防，此外又設置灌水門二所，排水門二所，同時並使用竹簍，以防止魚的逃走。除灌水和排水時以外，這四所的门，普通都用土塊關閉。排水時除必用竹簍以外，尚須用鐵絲網，以防止子魚的逃走。全部施設費約台幣一五〇元。使用於魚路及堤防的面積約一分，但在這堤防上可以種植甘薯，應菜，蕃茄，瓜類等，所以利用的面積不算損失。

豐年社各位先生雅鑒
星河初渡銀漢秋際蘭秋之節想
貴社業務以時而並進於斯可爲預卜可欣可賀
敬啓者貴刊內容豐富種種刊載記事實乃農家
指南匡我農民不鮮近看貴刊內載吳郭魚一事
此乃農家可以多得之福音，有趣味且非常有
利的副業，但不知魚苗價如何及從何入手，
素仰貴社爲我農人先知造福農家所希望指導
，又者繁殖及管理方法亦望詳細指導

中華民國四十年八月二十五日
彰化縣芬園鄉縣庄村彰南路一九號

張先生：您的信已收到，關於吳郭魚魚苗價格在雲林縣西螺地方連運費算在內，魚苗一斤爲六元，但因地方之遠近，其價格也因之不同，最好請詢問雲林縣農會及高雄漁會。至其繁殖及管理方法，請參考本刊第二期「吳郭魚在水田繁殖」一文及本期第七頁「水田養魚經驗談」一文爲盼。

二、養殖時期及養殖量 第一期作插秧後經過二十天的三月下旬，放養了吳郭魚苗二五〇斤，一斤魚加上運費共費六元，此外也將草魚八尾，鰱魚二尾，烏仔魚三十尾，鯉魚六十尾，混合放養，以作試驗。

三、給餌 米糠一日五斤，人糞尿一星期二十擔而已。

四、管理 田水時常要保持二寸至三寸深，只在除草施肥時要排水二、三天。

五、收量 三月下旬放養了魚苗，到五月下旬已生產了很多的子魚，但因連日的大雨，有了相當的損失。七月上旬當作魚苗賣出的有一五〇斤，其後常常賣出，其數已達四百斤以上。現在大尾的魚，還有三〇〇斤，可作魚苗用的尚有十萬尾。混飼的草魚，重約二斤，鰱魚因水多逃走，烏仔魚成績不佳，鯉魚成績良好。

照上面所說，漸次由大尾收穫，到第二期作水稻收割以後全部收穫時，其收量一定不少。

六、稻谷收量 昨年第一期作

農家除務農外，總常養一些雞鴨，而每年雞鴨生的蛋無形中給農家不少利益。如果我們能把這些蛋用簡易的方法加工後，不但他們的風味有了各式的增進，而且在市場上的價格也可以提高，這我們何樂而不為呢！現在把最普遍的加工方法，簡易地說明如下：

一、皮蛋：普遍用鴨蛋為

公斤加水成牛流動體加食鹽三
公斤及鹼若干。將蛋洗滌後用
鹽磨擦後浸入上述泥糊中，最
後將上敷鹽土之蛋密閉於冷暗
之處，二週間檢查鹽味，以加
減土，鹽，及鹼若干，三週後
即可，此貯藏物（泥糊）可以
反覆使用。

三、糟蛋：用三公斤之酒
糟及一公斤食鹽混合，將蛋於
此中浸漬半年以上，則蛋殼變
軟，而其內容如雲丹狀，即可



鼎蔭藍……………(回五第) 謠歌庄田
球繡拋來出娘月 秋中好五十月八
遊上天亮漂得粧 鏡作潮粉作雲白

三茄子在栽上最使人腦是枯和點小，的茄子的，

A black and white photograph showing two men in white uniforms, possibly agricultural workers or researchers, working in a field. They are both bent over, tending to plants in a row. The man on the left is holding a plant, while the man on the right is also working with a plant. The field is filled with rows of plants, and the ground appears to be tilled soil.

「成房度印」善改爲場良改林農區北臺爲圖
圍成育的種雜之配交子茄種來在與而質品之

的品種，原產爲印度，青枯病，並且能耐乾燥和抵抗病蟲害。因此可當得起「避病蟲性品種」的缺點，是皮稍爲硬一些，做菜的時候，滋味要差一些，所以最好把它和來種交配一下，使略爲接近理想一點。

栽培的要點，株間要稍爲寬一點，在幅寬一公尺的畦上，以○栽，九公尺的株間，用一條栽植，以光照防止因日後繁茂而伸展它固有的特性。

促進氮素分的供給要充分，以提高其品質。迅速發育，極力提高其品質。用化學肥料補給，不如用自給肥料來得好。施用色澤如魚粕、一米糠，可使品質整枝法，無摘葉之必要，如幹整枝法，繁茂而施行摘葉，是不好的。

四、越瓜（蕃瓜）本省越瓜需要量很大，所以也是夏作蔬菜中重要的一種，品種仍以採取在來種爲宜。

在栽培上，必須實行以下的數點：

「蔓」和「孫蔓」上，所以一定要整枝，類的着生纔會良好。整枝的方法，一是將親蔓在留下子蔓四、五枝的地方摘心，不使它繼續伸長，這樣就可以幫

在早晨。注意不要一直浸到次日的水灌。

量的氮素和水分，必須要多。並且對生育也有良好的影響。

法。驅除蚜蟲可以用魚藤液。又，現在還沒有一種食物可以防除。蠅蛆在還有一種食害瓜實的。時候再行驅瓜株枯萎不及這個時，而終使幼蟲便在根端產卵，孵化以後，並且還在成蟲不酸鈣來消滅它，因為成蟲不但會咬蝕葉子，並且還在根端產生很少的時候就撒佈D.T或在發生時候的時期，所以一定要在它實不去想一個防除的方法，上這散開來。把罪歸在風快的便擴着風在空中飄浮，很快的身子，這在作祟，因為露菌病的孢子菌乘枯黃；實際上，吹完了全是瓜葉的病故。件事；普通人是以為非常重要的。液體的撒佈，也是稻草波爾多害侵入的機會，一定得減少病除露菌病的方面，止落了類的地摘心的後面大約第二個的時候就在長的一個孫蔓來的時候，等方將子在第七或第八節的發地後再助子蔓的發育，然後將子蔓在幫助採莖來的時候，摘心類的後面大約第二個的時候就在個類的後面大約第二個的時候就在摘心的後面大約第二個的時候就在摘心的後面大約第二個的時候就在