農村指導

如何改進橘園的生產和果實的品質？

本省各地的柑橘園都陷入生產減低和品質不良的境地，造成這個生產低落品質不良的現象固然是由於許多人力所不能抗拒的外力，但因管理疏忽，以外，橘園的地勢和土質也有很大的影響，是否優良產量低的原因除了苗木的品質，似乎都嫌太低，這個產量

密植距離過遠



適合的栽植距離

本省一般橘園的平均生產量，其次就是應該注意園地排水良好。

怎樣延長柑橘果實的供應季節？

栽種柑橘的農友們，你們是否常常感覺到柑橘果實的供應季節太短促，同時又因為較大部份的果實，大都又在同一個時期內成熟出售時，得不到較好售價而感覺到不利？的確柑橘供應季節的短促，不但是柑橘農友們的煩惱，同時也為

讀者來函

敬啓者：讀貴刊九月一日號有如左意見，請答覆於紙上是禮。

一、「芳樟」與「本樟」應如何識別，適產地，種植期，其種苗，可由何處得來，價格多少？收量，生產步留，產品價錢若干？或介紹有關圖書。

庞尾鎮北溪里三八
鄭錦聲

本社覆信

鄭先生：你的信已經收到了。你要知道的問題，現在解答於左：

一、因芳樟、本樟，（俗云真樟）油樟在分類上同一種類較難分別，且無分別其學名（Cinnamomum camphora, Sieb）但其鑑別略述如次：

本樟
①葉形比芳樟稍小而圓②葉色比芳樟稍淡③其枝之角度較銳而細枝稍感硬直④木材纖維比芳樟稍細⑤木材香味普通⑥切木材置日光下曝晒有針狀小片木材置日光下曝晒有樟腦出現⑦抽出來之腦油加摘デニシェ試藥呈變色

芳樟
①葉形比本樟稍長而大②葉色比本樟稍濃③其枝之角度較鈍而細枝有幾分柔軟之感④木材纖維較粗而導管多⑤木材香味強烈並多少有苦味⑥全無⑦不變色

二、適產地
本省北部在標高一、〇〇〇米以下南部在標高一、五〇〇米以下之地域選擇肥沃而砂質土壤地內造林為適當。

三、種植期
①苗圃出山及管理上為利便之處且在向東或北之砂質土壤選為苗圃但採種後須要迅即播種，經一年之苗木可出山應用。②出山栽植之時期在北部約在十二月至三月，南部約在三月至五月間實施為宜。③栽植方法切斷地上莖植栽少有見之程度而充分腳踏實行為妥。

四、其他
①如需種苗可向林管局申請分讓②收量生產率價格係屬專賣事業之範圍故無法申明。

五、葉煉製油
煉葉製油之時凡有製油率佔其生葉重量之一〇〇分之一〇〇分之七至一〇〇分之一之間。

年次	立木株數	伐採株數	伐採材積	芳樟油	芳樟得量	備考
					獨立後之樟腦油	
一五	五四〇	一五〇	一四九	一四一	九四	
二〇	四一〇	八〇	九六六	一八〇	六七	
二五	三五〇	五五	一七三	一七八	一〇七	
三〇	二五〇	四〇	三九〇	一四九	一四九	
三五	二五	三五	一〇三	一三二	一三三	
計		三四〇	一九六	一九九	一三九	



種植距離與枝葉形狀

答案

第十頁

把鎖當中的樣對摺，從小孔裏穿出，像圖的樣子，穿進去，也是用同樣的方法。