

# 高冷地蔬菜栽培法

臺灣的夏季氣候炎熱，日照強烈，連綿不絕，病蟲害發生，而且時有颱風暴雨的襲擊，因此比較高級的蔬菜不易生長。所以每逢夏季蔬菜缺乏價格高漲，如果能利用山岳坡地或山窪地種植蔬菜，不但溫度低，生育好，病蟲害少，而且可以減少暴風雨的為害。種植地點以選擇海拔高度在300公尺以上，坡度比較平坦的土壤。

地（坡度以不超過十五度為限）。土壤以富含腐植質壤土或砂質壤土較佳。栽培時期及品種列表於後（請看後表）。

高冷地蔬菜在栽培管理上應特別注意的要點略述於下：


(一) 甘藍：春季育苗時應於苗床四周加風圍以禦寒風，為避免幼苗徒長，應於發芽後注意間拔至苗間距四—五公分，幼苗最好能移植一次，以使球莖堅實。苗長至本葉四—五枚時應即定植，圃地應以時時施用多量堆肥、整地時應過分乾燥。幼苗移植後應注意排水，應於移植後噴射魚肝油或H.C.，定植後如發生青蟲或夜盜蟲時應噴射D.D.T.以防治之。夏季雷雨期間容易發生炭疽病及根腐病，應於雨後噴射波爾多液防治之。六月七月間應每隔二十日以油粕水或硫酸銨施追肥一次計追肥

種類	品種	播種期	定植期	收穫期	畦幅	株距	播種法	備註
甘藍	黑葉キタセツシ	三月	四月	六月	1.5-1.8R	1.5-1.8R	撒播	播種後應注意排水
白菜	半結球山東白菜	三月	四月	六月	1.5-1.8R	1.5-1.8R	撒播	播種後應注意排水
蘿蔔	時	三月	四月	六月	1.5-1.8R	1.5-1.8R	撒播	播種後應注意排水
胡蘿蔔	時	三月	四月	六月	1.5-1.8R	1.5-1.8R	撒播	播種後應注意排水
蕃茄	時	三月	四月	六月	1.5-1.8R	1.5-1.8R	撒播	播種後應注意排水
豌豆	時	三月	四月	六月	1.5-1.8R	1.5-1.8R	撒播	播種後應注意排水
馬鈴薯	時	三月	四月	六月	1.5-1.8R	1.5-1.8R	撒播	播種後應注意排水

# 鐵甲蟲防治法

鐵甲蟲一般農友稱之為「鐵甲」或「烏龜」，是兩年來臺灣人人皆知的水稻重要害蟲，提起鐵甲蟲，大家也許就想到D.D.T.的確實效力。鐵甲蟲的防治，應注意D.D.T.的確實效力。鐵甲蟲的防治，應注意D.D.T.的確實效力。鐵甲蟲的防治，應注意D.D.T.的確實效力。

鐵甲蟲的防治，應注意D.D.T.的確實效力。鐵甲蟲的防治，應注意D.D.T.的確實效力。鐵甲蟲的防治，應注意D.D.T.的確實效力。鐵甲蟲的防治，應注意D.D.T.的確實效力。



鐵甲蟲的防治，應注意D.D.T.的確實效力。鐵甲蟲的防治，應注意D.D.T.的確實效力。鐵甲蟲的防治，應注意D.D.T.的確實效力。鐵甲蟲的防治，應注意D.D.T.的確實效力。

鐵甲蟲的防治，應注意D.D.T.的確實效力。鐵甲蟲的防治，應注意D.D.T.的確實效力。鐵甲蟲的防治，應注意D.D.T.的確實效力。鐵甲蟲的防治，應注意D.D.T.的確實效力。

鐵甲蟲的防治，應注意D.D.T.的確實效力。鐵甲蟲的防治，應注意D.D.T.的確實效力。鐵甲蟲的防治，應注意D.D.T.的確實效力。鐵甲蟲的防治，應注意D.D.T.的確實效力。

鐵甲蟲的防治，應注意D.D.T.的確實效力。鐵甲蟲的防治，應注意D.D.T.的確實效力。鐵甲蟲的防治，應注意D.D.T.的確實效力。鐵甲蟲的防治，應注意D.D.T.的確實效力。

鐵甲蟲的防治，應注意D.D.T.的確實效力。鐵甲蟲的防治，應注意D.D.T.的確實效力。鐵甲蟲的防治，應注意D.D.T.的確實效力。鐵甲蟲的防治，應注意D.D.T.的確實效力。

鐵甲蟲的防治，應注意D.D.T.的確實效力。鐵甲蟲的防治，應注意D.D.T.的確實效力。鐵甲蟲的防治，應注意D.D.T.的確實效力。鐵甲蟲的防治，應注意D.D.T.的確實效力。

鐵甲蟲的防治，應注意D.D.T.的確實效力。鐵甲蟲的防治，應注意D.D.T.的確實效力。鐵甲蟲的防治，應注意D.D.T.的確實效力。鐵甲蟲的防治，應注意D.D.T.的確實效力。






鐵甲蟲的防治，應注意D.D.T.的確實效力。鐵甲蟲的防治，應注意D.D.T.的確實效力。鐵甲蟲的防治，應注意D.D.T.的確實效力。鐵甲蟲的防治，應注意D.D.T.的確實效力。

鐵甲蟲的防治，應注意D.D.T.的確實效力。鐵甲蟲的防治，應注意D.D.T.的確實效力。鐵甲蟲的防治，應注意D.D.T.的確實效力。鐵甲蟲的防治，應注意D.D.T.的確實效力。

鐵甲蟲的防治，應注意D.D.T.的確實效力。鐵甲蟲的防治，應注意D.D.T.的確實效力。鐵甲蟲的防治，應注意D.D.T.的確實效力。鐵甲蟲的防治，應注意D.D.T.的確實效力。

鐵甲蟲的防治，應注意D.D.T.的確實效力。鐵甲蟲的防治，應注意D.D.T.的確實效力。鐵甲蟲的防治，應注意D.D.T.的確實效力。鐵甲蟲的防治，應注意D.D.T.的確實效力。

鐵甲蟲的防治，應注意D.D.T.的確實效力。鐵甲蟲的防治，應注意D.D.T.的確實效力。鐵甲蟲的防治，應注意D.D.T.的確實效力。鐵甲蟲的防治，應注意D.D.T.的確實效力。



# 術語略解

雜種：臺灣俗語有時叫做「改良種」，互相配合後，所得的後代，叫做雜種。

坡度：斜角是用「度」為單位來表示的。直立的公認分為九十度。

海拔：把海面作為起點測量的地高低。

市兩：是等於臺兩的十分之三。

市斤：是等於臺斤的十分之三。

苞：是一個特殊的表示，原形是動植物初期的幼胎。

形成層：樹木的木質部層，能產生新的樹皮。由此看來，樹木的長大，正是此層的作用。

