




魚藤の別名は「デリス」で、本省の各地で栽培でき...

本省の氣候は濕氣が多く、温暖であるため、農作物の害...

魚藤の別名は「デリス」で、本省の各地で栽培でき...

水稲、蔬菜、棉、麻などの害虫に使用して総て効果が...



DDT粉 現在使用されているのが普通で、これを五〇〇〜一〇〇〇...

水溶性 DDT 普通の DDT に五〇パーセントの DDT で、二〇〇...

1% BHC 粉 作物百株に DDT を約五匹の害虫を殺す...

仔牛の下痢にオレオマイン 仔牛の下痢は生後一...

ヒノキの挿木に成功 日本林業の長野林業局は...

農村とラヂオ 廣島縣立花村は最近村費...

林地租地法が出来る様子を、造林社が新聞によれば、造...

山地租地造林についての質問

一、租地造林申請人は左の如く規定されて...

また造林に適した地域があり、むしろ其の緑化を先きに計るべき...

使用前に乳劑と等量の水を充分に混合させてから、再...

石灰硫黄合劑は石灰と硫黄を煮て混合したもので、深...

タバコノ莖 水稲に散布するタバコノ莖は...

タバコノ葉 粉状のタバコノ葉を石灰に混合...

倉庫の害虫 人の指導を受けて行ふ事に...

Table with 2 columns: 種類 (Type) and 率 (Rate). Rows include 用材林 (Timber forest) and 遊歩林 (Recreation forest).

