

# 怎樣徹底防治甘蔗葉燒病

甘蔗葉燒病是近年來發現的一種甘蔗病害，自民國三十八年起，甘蔗發生葉燒病的面積逐年增加，而且分佈全省。臺灣糖業公司自營農場調查的結果，三十九年至四十二年發病的面積，只有幾百公頃，四十年至四十二年發病的面積，多達三千七百餘公頃，四十一至四十二年發病的面積，多達九千餘公頃，損失很大。以C.O.二九〇來說，病株的產量較健康株減少一七.二%，標準產糖率也較健康株降低二.二%。

防治甘蔗葉燒病，我們應有的步驟如下：

第一、先要認識葉燒病：葉燒病發生在甘蔗的葉片上，主要特徵是發病中期中，葉片上發生紡錘狀枯條病斑，兩端帶少許黃褐色或延長。病斑的長短不一，位置不定，或在葉片中央或靠近葉緣。病斑的長短不一，延長的上面，互相併合而成一片枯葉。病斑的長短不一，延長的上面，互相併合而成一片枯葉。病斑的長短不一，延長的上面，互相併合而成一片枯葉。

甘蔗葉燒病是近年來發現的一種甘蔗病害，自民國三十八年起，甘蔗發生葉燒病的面積逐年增加，而且分佈全省。臺灣糖業公司自營農場調查的結果，三十九年至四十二年發病的面積，只有幾百公頃，四十年至四十二年發病的面積，多達三千七百餘公頃，四十一至四十二年發病的面積，多達九千餘公頃，損失很大。以C.O.二九〇來說，病株的產量較健康株減少一七.二%，標準產糖率也較健康株降低二.二%。

防治甘蔗葉燒病，我們應有的步驟如下：

第一、先要認識葉燒病：葉燒病發生在甘蔗的葉片上，主要特徵是發病中期中，葉片上發生紡錘狀枯條病斑，兩端帶少許黃褐色或延長。病斑的長短不一，位置不定，或在葉片中央或靠近葉緣。病斑的長短不一，延長的上面，互相併合而成一片枯葉。病斑的長短不一，延長的上面，互相併合而成一片枯葉。病斑的長短不一，延長的上面，互相併合而成一片枯葉。

甘蔗葉燒病是近年來發現的一種甘蔗病害，自民國三十八年起，甘蔗發生葉燒病的面積逐年增加，而且分佈全省。臺灣糖業公司自營農場調查的結果，三十九年至四十二年發病的面積，只有幾百公頃，四十年至四十二年發病的面積，多達三千七百餘公頃，四十一至四十二年發病的面積，多達九千餘公頃，損失很大。以C.O.二九〇來說，病株的產量較健康株減少一七.二%，標準產糖率也較健康株降低二.二%。

防治甘蔗葉燒病，我們應有的步驟如下：

第一、先要認識葉燒病：葉燒病發生在甘蔗的葉片上，主要特徵是發病中期中，葉片上發生紡錘狀枯條病斑，兩端帶少許黃褐色或延長。病斑的長短不一，位置不定，或在葉片中央或靠近葉緣。病斑的長短不一，延長的上面，互相併合而成一片枯葉。病斑的長短不一，延長的上面，互相併合而成一片枯葉。病斑的長短不一，延長的上面，互相併合而成一片枯葉。



甘蔗葉燒病是近年來發現的一種甘蔗病害，自民國三十八年起，甘蔗發生葉燒病的面積逐年增加，而且分佈全省。臺灣糖業公司自營農場調查的結果，三十九年至四十二年發病的面積，只有幾百公頃，四十年至四十二年發病的面積，多達三千七百餘公頃，四十一至四十二年發病的面積，多達九千餘公頃，損失很大。以C.O.二九〇來說，病株的產量較健康株減少一七.二%，標準產糖率也較健康株降低二.二%。

防治甘蔗葉燒病，我們應有的步驟如下：

第一、先要認識葉燒病：葉燒病發生在甘蔗的葉片上，主要特徵是發病中期中，葉片上發生紡錘狀枯條病斑，兩端帶少許黃褐色或延長。病斑的長短不一，位置不定，或在葉片中央或靠近葉緣。病斑的長短不一，延長的上面，互相併合而成一片枯葉。病斑的長短不一，延長的上面，互相併合而成一片枯葉。病斑的長短不一，延長的上面，互相併合而成一片枯葉。

## 臺灣省農村物價統計表

項 目	單 位	各 地 區 平 均 價 格						全 省 平 均	比 三 月 中 旬 漲 跌 比 率	收 購 或 配 售 價	
		臺北地區	新竹地區	臺中地區	臺南地區	高雄地區	屏東地區				
<b>甲 農村生產品</b>											
大賣價格											
農 產 品											
稻	種	100斤	117.00	117.67	116.67	118.14	115.00	111.50	116.62	% 2	—
籼	種	100斤	115.80	117.33	114.00	115.44	115.83	112.50	115.25	% 2	—
雜	種	100斤	—	—	—	—	—	—	—	—	—
大豆	種	100斤	—	—	—	165.00	183.80	—	176.28	x 1	—
綠豆	種	100斤	—	—	—	120.00	163.65	—	163.65	x 2	—
黑豆	種	100斤	—	—	—	112.33	119.33	—	120.00	x 15	—
花生	種	100斤	26.00	23.50	15.57	17.67	20.86	18.00	19.23	x 1	—
芝麻	種	100斤	23.50	22.00	13.60	15.86	20.29	17.00	17.13	x 2	—
花生油	斤	—	—	—	—	60.60	72.50	—	64.00	x 3	—
菜油	斤	—	—	—	—	57.33	67.50	—	61.40	x 7	—
花生粉	斤	—	—	—	—	151.67	—	—	151.67	x 10	—
花生殼	斤	—	—	—	—	195.00	174.38	165.00	178.50	x 4	—
花生仁	斤	—	—	—	—	270.00	264.00	265.00	264.05	x 4	—
花生油	斤	—	—	—	—	22.92	—	—	21.79	x 2	—
花生粉	斤	—	—	—	—	112.00	—	110.00	105.50	x 6	—
花生殼	斤	—	—	—	—	94.50	—	—	94.50	x 3	—
特用作物	淨價	100斤	—	—	—	194.41	182.65	189.72	201.32	x 2	240.00
砂糖	斤	—	—	—	—	823.33	832.50	—	828.57	x 2	—
茶葉	斤	—	—	—	—	242.00	240.00	190.00	215.50	x 6	—
香蕉	箱	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
青 蕉	箱	—	45.00	28.66	38.00	34.67	30.00	—	32.12	x 2	外銷 56.43
畜 產 品											
水牛	頭	—	2,066.67	1,725.00	1,625.00	1,975.00	1,714.29	1,900.00	1,818.29	—	—
黃牛	頭	—	2,400.00	1,883.33	1,816.67	2,035.71	1,742.86	1,750.00	1,881.03	—	—
豬	頭	—	479.67	457.50	426.50	404.60	392.86	415.00	427.14	x 2	—
雞	斤	—	11.83	10.08	9.22	8.82	8.50	10.25	9.54	x 3	—
鴨	斤	—	7.83	6.75	5.54	5.75	5.30	5.75	6.07	x 2	—
鵝	斤	—	6.74	5.50	5.39	5.15	4.92	5.50	5.46	x 2	—
雞蛋	個	—	80.00	73.33	66.64	65.00	73.14	79.00	69.81	x 3	—
鴨蛋	個	—	65.00	65.00	58.58	57.10	57.00	61.50	59.24	x 4	—
<b>乙 農村消費品</b>											
小賣價格											
生 產 用 品											
肥料	100斤	—	160.00	—	149.14	154.50	160.00	—	152.73	x 3	116.62
硫酸	100斤	—	—	—	41.00	—	—	—	41.00	x 3	46.65
磷	100斤	—	—	—	—	—	—	—	—	x 1	116.62
飼料	100斤	—	121.25	126.50	118.00	140.00	—	160.00	123.82	x 2	—
餅	斤	—	65.83	76.67	76.67	69.22	70.71	57.00	71.60	x 1	—
花生	斤	—	81.20	83.37	78.27	79.19	77.67	81.18	79.57	x 1	—
花生	斤	—	—	122.50	127.75	136.67	—	130.00	129.13	x 2	—
農具	架	—	—	1.02	1.16	1.00	1.10	1.20	1.11	—	—
連柄	架	—	27.20	25.00	19.48	18.60	17.93	22.50	20.86	—	—
鐵	架	—	35.00	29.50	25.32	24.00	23.71	28.00	26.87	—	—
鐵	架	—	50.00	64.83	68.10	104.44	95.00	67.50	79.58	—	—
鐵	架	—	422.00	460.00	512.50	550.00	738.00	550.00	533.04	—	—
生 活 用 品											
米	斤	—	1.71	1.65	1.68	1.70	1.73	1.66	1.69	x 1	—
菜	斤	—	1.71	1.67	1.64	1.68	1.71	1.66	1.67	x 1	—
魚	斤	—	7.58	6.92	7.08	7.20	6.93	6.80	7.12	x 2	—
魚	斤	—	4.10	4.68	4.27	4.17	4.92	6.40	4.47	x 2	—
魚	斤	—	3.63	4.20	4.67	3.58	4.93	5.75	4.34	x 2	—
魚	斤	—	5.50	5.73	5.80	5.80	5.76	5.70	5.74	x 2	—
魚	斤	—	1.92	2.17	1.78	1.79	1.89	1.90	1.86	x 4	—
布	碼	—	7.79	6.28	8.00	5.93	6.99	6.50	6.82	x 1	—
布	碼	—	5.57	5.50	6.48	5.14	5.79	6.00	5.68	x 1	—
布	碼	—	3.82	4.78	4.22	3.82	4.27	4.00	4.15	x 1	—
布	碼	—	1.00	1.03	0.98	0.92	0.98	0.95	0.97	x 1	—
布	碼	—	1.00	0.98	1.38	0.84	1.19	0.75	1.08	x 1	—
油	斤	—	24.00	23.80	24.79	21.83	22.71	26.00	23.61	x 2	—
油	斤	—	1.70	1.92	1.88	1.92	1.80	1.50	1.84	x 1	—
油	斤	—	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	x 1	—

甘蔗葉燒病是近年來發現的一種甘蔗病害，自民國三十八年起，甘蔗發生葉燒病的面積逐年增加，而且分佈全省。臺灣糖業公司自營農場調查的結果，三十九年至四十二年發病的面積，只有幾百公頃，四十年至四十二年發病的面積，多達三千七百餘公頃，四十一至四十二年發病的面積，多達九千餘公頃，損失很大。以C.O.二九〇來說，病株的產量較健康株減少一七.二%，標準產糖率也較健康株降低二.二%。


防治甘蔗葉燒病，我們應有的步驟如下：

第一、先要認識葉燒病：葉燒病發生在甘蔗的葉片上，主要特徵是發病中期中，葉片上發生紡錘狀枯條病斑，兩端帶少許黃褐色或延長。病斑的長短不一，位置不定，或在葉片中央或靠近葉緣。病斑的長短不一，延長的上面，互相併合而成一片枯葉。病斑的長短不一，延長的上面，互相併合而成一片枯葉。病斑的長短不一，延長的上面，互相併合而成一片枯葉。

甘蔗葉燒病是近年來發現的一種甘蔗病害，自民國三十八年起，甘蔗發生葉燒病的面積逐年增加，而且分佈全省。臺灣糖業公司自營農場調查的結果，三十九年至四十二年發病的面積，只有幾百公頃，四十年至四十二年發病的面積，多達三千七百餘公頃，四十一至四十二年發病的面積，多達九千餘公頃，損失很大。以C.O.二九〇來說，病株的產量較健康株減少一七.二%，標準產糖率也較健康株降低二.二%。

防治甘蔗葉燒病，我們應有的步驟如下：

第一、先要認識葉燒病：葉燒病發生在甘蔗的葉片上，主要特徵是發病中期中，葉片上發生紡錘狀枯條病斑，兩端帶少許黃褐色或延長。病斑的長短不一，位置不定，或在葉片中央或靠近葉緣。病斑的長短不一，延長的上面，互相併合而成一片枯葉。病斑的長短不一，延長的上面，互相併合而成一片枯葉。病斑的長短不一，延長的上面，互相併合而成一片枯葉。



甘蔗葉燒病是近年來發現的一種甘蔗病害，自民國三十八年起，甘蔗發生葉燒病的面積逐年增加，而且分佈全省。臺灣糖業公司自營農場調查的結果，三十九年至四十二年發病的面積，只有幾百公頃，四十年至四十二年發病的面積，多達三千七百餘公頃，四十一至四十二年發病的面積，多達九千餘公頃，損失很大。以C.O.二九〇來說，病株的產量較健康株減少一七.二%，標準產糖率也較健康株降低二.二%。

防治甘蔗葉燒病，我們應有的步驟如下：

第一、先要認識葉燒病：葉燒病發生在甘蔗的葉片上，主要特徵是發病中期中，葉片上發生紡錘狀枯條病斑，兩端帶少許黃褐色或延長。病斑的長短不一，位置不定，或在葉片中央或靠近葉緣。病斑的長短不一，延長的上面，互相併合而成一片枯葉。病斑的長短不一，延長的上面，互相併合而成一片枯葉。病斑的長短不一，延長的上面，互相併合而成一片枯葉。