




省農業試驗所 陶家駒

請隨時注意田菁和甘藷田裏，如發現有斜紋夜蛾，要及早撲滅，以免引起黃麻幼蟲的害。黃麻幼蟲的害，可以用五百倍的魚藤精乳劑噴射。

(一)斜紋夜蛾 本省中、南部種植的黃麻，在三、四月播種出苗後，附近的田菁或甘藷，如有斜紋夜蛾(ハスモ)之害，則黃麻亦受其害。...



圖二 斜紋夜蛾 (雌) 成 幼

多，或者不會發生。但政府，鄉鎮公所及各縣市政府，應負指導之責，...

臺灣省農村物價統計表 四十二年五月下旬 價格單位：新臺幣元


Table with multiple columns: 項目 (Item), 單位 (Unit), 各地區 (Regions), 平均價格 (Average Price), 全省平均 (Overall Average), 比上月 (vs Last Month), 比上月百分比 (vs Last Month %).

往整區黃麻一葉不留，只剩光桿，損失極大。黃麻幼蟲的害，在黃麻的葉片或莖上，...



黃麻尺蠖

(三)蘋果幼蟲 除了上述害蟲外，還有蘋果幼蟲(リンゴアブラムシ)，為害黃麻的嫩葉和嫩莖，...



蘋果幼蟲

用同量的切草。 (5) 幼蟲或哺乳中的母牛，在分娩前，應每日給與第一號飼料，...

較北的青犢骨(二圖) 腳的丁命他維和質缺(甲) 薄壁管骨，管骨，密質管骨，的常正(乙) 厚壁