

農業
信箱
各期所經
過的時間

死亡。(陶家駒)
瓊麻的病害和蟲害

問：瓊麻有沒有病害和蟲害？要怎樣防治？(宜蘭縣陳錦崑)

答：瓊麻很少發生病蟲害，常嚴重，所以想明瞭它的發生情形，以利防治。

問：本地方發生螟蟲非形，以利防治。時期是多久？須經過幾天？成蟲自出蛾到蟲經過幾天？(雲林縣斗南鎮沈幼)

答：①雲林一帶三化螟蟲通常一年發生五代，但如一年發生六代。每代發生時期極不整齊，詳情請看臺灣農林月刊第七卷第五期第十三至十六及十二頁。(按臺灣農林月刊社址在臺北市永康街十三巷十五號)

答：②三化螟蟲的卵，幼蟲，蛹和成蟲期間，因環境而異。平均七天；幼蟲春季六十天，夏季三十天，越冬的是一百五十天，蛹期七天，成蟲羽化後當夜或次夜交尾，交尾後次夜產卵，產卵一、二夜後，便

開始侵食，吃到飽，為害極大。

問：我種的香蕉園原來每年產量很豐富，但從前年起就發生蟲害，被侵食的空洞密佈。

新竹縣橫山鄉徐昌萼答：依來信所說，這是香蕉象鼻蟲(見生活史圖)。香蕉象鼻蟲原來並非本省所有，是由海外隨香蕉苗傳入本省，成爲目下本省香蕉最厲害的害蟲。它的生活史是這樣的：幼蟲吃假莖內，並在其中化蛹，蛹爬出地上，交尾後次夜產卵，卵產在接近地面的假莖

在臺灣還沒有到利用的階段。(郁宗雄)

問：我們番茄的一切用途。(翁青鄉李謀我)

答：番茄果實內含有豐富的甲種維他命和丙種維他命，並且含有多種有機酸，有助消化、清血、補肝、利尿、益腎、健胃等醫藥上的功效，所以是我們營養健康上的重要蔬菜。番茄生果可以當水果生吃，可以做蔬菜作湯或炒食，可以製造各種加工品，過去臺灣的番茄加工品罐頭的生產額，僅次於鳳梨，佔第二位，以製廢物可以作肥料及飼料的。

答：①一般吳樹的空中壓條法(即高壓法)，是選用二至十五公厘(直徑約十

釐米)施行環狀剝皮的

方法。

問：現在養

鷄的原因

答：你所提出的「亞嘴鷄」，這是在書本上稱之爲不正常的一類。這種鷄變上顎較短，或歪在一邊，就是鷄的上下唇不合在一起，以致啄食困難，也就不會成長了。這種情形在幼雛的時候就常常發生。請問這是什麼原因？有醫治的方法嗎？(嘉義縣竹崎鄉彭登開)

答：你所提出的「亞嘴鷄」，這是在書本上稱之爲不正常的一類。這種鷄變上顎較短，或歪在一邊，就是鷄的上下唇不合在一起，以致啄食困難，也就不會成長了。這種情形在幼雛的時候就常常發生。請問這是什麼原因？有醫治的方法嗎？(嘉義縣竹崎鄉彭登開)

答：你的豬經常醫診斷為

齧齒病，給與齧齒藥，

這樣的情況，齧齒藥不見有效。

答：你的豬經常醫診斷為

齧齒病，給與齧齒藥，