



豐年畫報




六、臺灣大部分的廁所，挑糞時，皆用這種舀取方式，這是蛔蟲卵蔓延的一大原因。



七、農家常將人糞尿先放進糞池，待腐熟後，再作為肥料施用。因此，蔬菜的葉上或根部，都附着了不少蟲卵。



八、乾田（畑）裡施用的水肥乾燥以後，蛔蟲卵就會和塵土隨風飄揚，撒布在農村各處。蟲卵即如圖所示經過手或食物，傳進體內。



九、預防上，應該先將蔬菜洗乾淨後再烹調，同時應該時常洗手。尤其不應讓小孩舐食手指。



十、農村裡，雖然經常防範，蛔蟲仍易滋生。如一經發現有蛔蟲病症時，應該立即服用驅蟲劑。服用驅蟲劑要受醫師的指導。




蟲 蛔

（詳細請參看本刊第三卷第十六期及本期第十頁）


蛔蟲問題在農村，雖然如此嚴重，但是能夠知道蛔蟲怎樣傳染的人很少。本刊特用照片說明介紹其生活實態，以喚起讀者注意。

人體內的機會。被蛔蟲寄生的人，在農村特別多，據醫師估計，至少有半數以上的農村兒童，體內都有蛔蟲寄生。




在人體寄生蟲中，蛔蟲是最普遍最常見的。尤其是東方各國在農業上，除化學肥料外，尚且大量使用堆肥、人糞尿等，因此，蛔蟲的卵容易到處傳播，隨時隨地都有連同食物進入


一、在每格面積一平方公分的格紙上，一條標準大小的蛔蟲所顯示出的長度。通常，雌性的較大，長約三十公分，雄性稍短，約有二十公分。



二、如將蛔蟲反吊，則不停地擺動頭部，很是活潑。



三、圖部解的蟲蛔性雌、三。倍五・七之長身為約度。



四、塊卵狀膏出排即，擠壓子宮蟲蛔性雌將如、四。少不量為知可亦，較比柴火端左與。

