

如

何

防

治

豆

潛

蟲

省農試所鳳山熱帶園藝試驗分所 陳貴華

豆潛蠅（ササゲクギバ）是專門食害豆科植物的一種重要害蟲。它成蟲是一種黑褐色的小蠅，產卵在豆類的幼苗莖組織內。幼蟲是乳白色，有黑色的蛆，在莖組織內孵化後，鑽入莖的內部為害。被害的豆，起初豆莢上發生一至三條的白條，後來為害程度進展，以致豆莢裂開，停止生育或枯死。

南部十二月至二月間栽培的菜豆（敏豆）或豇豆等蔬菜，出苗不久，（苗高至三四十寸時），就發現枯死株。拔起枯死株一看，可以看到莖基部有裂開或腐爛，扯開豆莢，詳細檢查，就很容易的看到黃褐色的蛹或快化蛹的幼蟲。一株中的蟲數，少則有十頭，多時有四十頭以上。各種豆類中，敏豆受害最重，其次是豇豆、綠豆、黃豆、烏豆等。

豆潛蠅發

生時期

在南

部以

十二月

至

二月

間最

多這

時正

是豆

類的

栽培期

以後漸

減少

到雨

期未見

有發

生最

多北

部是四

五月發

生最

多中

部發

生較

南部為少

九年以來

鳳山

熱帶園

試

驗

從民國卅

年

開始

試驗

。

豆潛蠅發生時期，在南部以十二月至二月間最多，這時正是豆類的栽培期，以後漸漸減少，到雨季發生最多，中部發生較少，南部為少。

豆潛蠅發生時期

在南部以十二月

至二月間最

多這時正

是豆類的

栽培期以後漸

減少到雨

期未見有發

生最多北

部是四月發

生最多中

部發生較少

南部為少。

九年以來

從民國卅

年開始試驗

。

乳劑時，要特別注意藥液的稀釋調合方法。如調合的次序不對，不但減少殺蟲效果，而且很容易發生「藥害」。因為這二種藥劑，都是由幾種油類混和製成，調製時一定要使藥劑與水完全混合。調製時最初先加入少量的水，一面攪拌一面充分攪拌，才可以得到完全乳化的液劑。慢的倒下所需的水量，一定先

慢的倒下所需的水量，一定先

慢的倒下所需的水量，一定先