本年度小麥肥料施用方法和價值

省糧食局肥料運輸處

問：今年度的小麥肥料甚麼時候開始分配呢？

答：已經開始分配了。

問：種植小麥的農戶，每公頃可以受配多少肥料呢？

答：臺北、新竹、臺東地區，每公頃分配硫酸銨三〇〇〇公斤，過磷酸鈣或熔磷二〇〇〇公斤，氯化鉀四〇公斤，合計五四〇公斤。臺中、臺南地區每公頃分配含硝硫酸銨二五〇公斤，過磷酸鈣二〇〇公斤，氯化鉀四〇公斤，合計四九〇公斤。

問：這這幾種肥料，每公斤的價錢多少呢？

答：含硝硫酸銨每公斤臺幣一元六角五分，硫酸銨每公斤臺幣一元四角，過磷酸鈣每公斤臺幣八角，熔磷每公斤臺幣八角，氯化鉀每公斤臺幣一元三角。領配一公頃的小麥肥料，在臺北、新竹、臺東地區一共要繳臺幣六三二元；在臺中、臺南地區一共要繳臺幣六四二元五角。

問：現在小麥一公斤多少錢，施用肥料合算不合算，請你說明一下好嗎？

答：現在小麥每公斤價錢是二元五角（每臺斤一元五角），施用肥料，對農家收益極大。根據試驗的結果，一公斤的硫酸銨可以增產小麥約二・五公斤；一公斤的含硝硫酸銨可以增產小麥約三・二五公斤，一公斤的過磷酸鈣或熔磷可以增產小麥約一・五公斤，一公斤的氯化鉀可以增產小麥約一・八公斤。因此，在臺北、新竹、臺東地區，每公頃分配肥料五四〇公斤，如能施用得法，可以增產的小麥就有一一一〇公斤。假使每公斤小麥售價按二元計算，價值是二二七七五元，扣除施肥成本六三三元，農友實得利益有二一一四三元之多。臺中、臺南地區，每公頃分配肥料四九〇公斤，可以增產一一七三公斤，價值是二，九三三元五角。扣除施肥成本六二四元五角，實得利益是二，三〇元。臺中、臺南地區，氣候適合種植小麥，所以小麥的產量也比較多，希望該地區的農友多多種植。

問：小麥肥料的施用方法怎樣呢？

答：過磷酸鈣或熔磷應該在小麥播種以前，化鉀，作基肥施用。含硝硫酸全部當作基肥施用。含硝硫酸銨或硫酸銨，可以一部份連同磷鉀肥料，充作基肥。但在臺北臺東地區特別注意。熔磷是鹼性肥料，應分配熔磷的農戶可和酸性的硫酸銨混合使用，最好要等熔磷施用以後兩三天，再將一部份的硫酸銨撒入土中，覆土播種。其餘的肥料，應該在播種後二十天以內，看小麥生長的情形，分幾次作追肥施用。

問：這批肥料甚麼時間分配結束呢？

答：本年十一月卅日截止分配，請趕快到農會去領。

（上接第八頁「怎樣養兔」）

因此，要有一定的繁殖方法（即純種、雜交、或近親繁殖法）和繁殖上必要的各項記錄。

②配種年齡，普通公兎在出生後九個月左右；母兎只須六、七個月就可開始配種，繼續二、三年。

③家兎自出生後五個月上下就會發性，母兎便開始發情，以後平均每隔一週發情一次。公兎除了氣候或健康影響而外，經常都有「交配慾」。母兎發情期開，外陰部稍稍腫起，現桃紅色，動作活潑，神態不安，前肢常搔抓敷藁，爬在別兎背上作交配姿態，食慾也略微減退。這時把母兎送入公兎籠內，任它交配，約二、三分鐘，公兎發出叫聲或橫臥時，即表示性交滿足，母兎可以送回原籠。

④家兎每月交配不得超過十五次，普通三天一次，交配時間最好在上午九時至十時。



（二圖附）
群兎飼放或飼欄的時飼料箱
（利用油煤罐改裝）

通常公兎一頭可以和母兎五、六頭作爲一組飼養。

⑤母兎受胎以後的象徵：（一）腹部漸漸膨大，約經過十日可在腹部觸摸大豆大的胎兒；二十日下腹部可摸胎兒頭部。（二）停止發情，迴避交尾，這時也要禁止交尾。（三）食慾好，體重漸漸增加（一二—一三%），乳頭現淡紅色，乳房增大（懷胎期平均三十天至三十二天）。

⑥分娩前後和分娩時的注意點：（一）分娩前三、四天（即受胎後第二十四至二十五天左右）移入產箱飼養，產箱內應加藁料。（二）母兎自己咬下腹毛作巢，就是將要分娩的象徵。（三）分娩無須人工幫助，也不必驚動它。（四）分娩後數日，食慾減退，但應另給水分，分娩一週以後應加給飼料量。（五）初生仔兎切不要撫摸，以免發生母兎食仔兎的壞習慣。

⑦每胎仔兎數超過八頭以上，要把體弱或發育不良的仔兎淘汰，否則乳量不足。

⑧仔兎出生後十三天左右「開眼」，二十天前後開始喂料，三十五天左右「離乳」。仔兎給料量，生後兩個月爲成兎的三分之一；生後三個月爲成兎的五分之二；生後四個月爲成兎的三分之二；五個月以後，和成兎同量。

（五）怎樣預防兎病

家兎疾病種類很多，但根據日本畜產試驗場畜兎一萬三千餘頭的疾病統計，死亡數不過百分之六强。本省兎病中以消化器病佔大多數，其次是球蟲病（コクシヂウム），他種傳染病極少。因此，家兎的疾病預防較單純，除了日常飼餵管理稍加注意外，兎籠兎舍和其他用具，每年春秋兩季應消毒一次。平日如見精神萎靡神態失常、毛無光澤、食慾不振、糞便異常、體溫上昇攝氏四十度以上、鼻腔口邊汚穢或腹部膨大等等現象的，要立即隔離，並請獸醫診治。

（附圖三）
鑑別家兎雌雄時的姿勢