



百日咳

吳廣利

春天到了，乍暖還寒的時節，衣着起居稍一不慎，許多季節性流行病就會感染起來。百日咳，無疑地是春天與冬天中兒童最易感染的一種流行病，當妳們的寶貴衣著在外面受寒回來，不是頭痛發熱，就是頻頻咳嗽不止，妳不要認為這是一點小病「感冒」，而毫不理會，其實咳嗽發熱何止感冒，如果時間久了，很可能就是百日咳的象徵，請妳一定要注意，百日咳！是春天最流行的兒童疾病之一。

百日咳的象徵

徵是甚麼？

百日咳病是由於百日咳桿菌藉呼吸而傳染入呼吸器官的。當該病流行時，兒童在各公共場所活動最易感染，所以百日咳流行時期應盡量避免出入娛樂場所。該病菌感染初期傳染力極強，至少在五六週以後才會消聲隱跡，其流行最廣的時期是在冬春兩季。

當該病感染後，一、二週間即有與傷風同樣的症狀出現，包括咳嗽及流鼻涕，咳嗽在就寢後不久及早晨最顯著，如此情形繼續至一、二週間其咳嗽漸增強，這是發作性的百日咳獨特的象徵，繼而成短咳，呼吸深而長，最後發出一種特殊的嗚嗚聲或吐出粘而透明之痰後則咳嗽停止。不過在整個百日咳的過程中，這兩種情形也許都沒有。咳嗽發作時，顏面潮紅，角膜充血而流淚，舌突出呈痛苦狀，嘔吐，眼角紅腫，夜間咳嗽甚劇影響睡眠，不足，此種咳嗽發作時期約三

六週間，以後咳即逐漸減輕，發作次數亦少。

百日咳有辨

法防治嗎？

過去對該病最感煩惱的是缺乏特效藥，常常由於病期拖延六星期到幾個月之久，這病因陣陣咳嗽使全身緊張，加之常常嘔吐，睡眠減少體重減輕，於是兒童身軀弱少體重不良以致抵抗力削弱，因而有許多乳兒生後數月由百日咳而死的不知凡幾。今日科學的發達醫藥的進步，對付百日咳的特效藥也多了，諸如鏈黴素、土黴素、金黴素、氯黴素等內服，注射吸入均非常有效，其他如百日咳疫苗清注射亦有效。

百日咳常可引起支氣管炎、肺炎、百日咳肺炎、結核等病，這是最可怕的合併症不可不注意。

預防百日咳，主要的是預防注射，這有百分之九十以上效果，每當冬春之季，有百日咳流行可疑時應禁止兒童在外面遊戲並預防注射，以免遭致意外的傳染。

最多イ性病 梅毒の予防

性病は普通に梅毒、淋病、軟性下疳、第四性病の四種に分けられますが、このうち梅毒は治療が最も面倒な病気で、重病の時には患者は陵人同様となり、非常に恐ろしい病です。その上、この病氣は性病の中でも患者が最も多く、しかも、患者の中には梅毒を有している事を知らない場合さへあるのです。

梅毒は病氣の程度によつて、第一期から第四期に分けられますが、このうち第一期には、陰部に豆状の硬いものを生じたり、腿のリンパ線が腫れたり、第二期には全身に豆状、淡紅色の發疹を生じたりしますが、これ等の初期の症狀には痛みや痒みが無く、放置しておいても自然に消失するので、油断して治療を怠る人があります。然しこのような状態は一時的で、數年後には第三、第四期梅毒に進行して、廢人同様となり、治療も困難となるのです。

梅毒は早く治療をしないと、悲惨な状態になります。それよりも梅毒の社會、家庭に及ぼす大害は、梅毒症の兩親によつて病氣が子供に遺傳され、毎年多くの先天性梅毒の幼兒が生れてゐる事です。

例へば、臺灣では、毎年約三十萬の新生兒が生れていますが、このうち先天性梅毒症が少くとも數千人あると見積られてゐます。然し、梅毒症の胎兒の多くは、體内の毒素によつて生れる前に死産、流産をしますから、よく流産する母親は梅毒の有無を検査するもらふべきです。先天性梅毒の新生兒は、皮膚に皺が多、鼻がつまつてお乳を吞ませるのに困難で、口の周圍や手足のうらが赤くなり、裂け目ができたりします。また、骨も梅毒のために運動が自由にならず、内臓も梅毒に害されて、これを養育する母親の苦勞は大變なものです。

△割れた茶碗などを接ぐにはカゼイン糊を用ひるのが最も良いですが、地方によつてはカゼイン糊を買へないので、簡単な接合法を紹介いたします。小麦粉と石灰を用意し、これを鶏卵の白身と混合して、糊状に練ります。この糊を茶碗の割れ目に塗り、茶碗を接合すると、二、三時間で元通りになります。

△庖丁は、使つた後は水洗ひしよく拭いておきます。熱湯で洗ふと鋼が悪くなります。また、刃を鋭利にするため、二、三日おきに砥石で磨く事が必要ですが、ニツケル鍍金したものは、強く磨

便利帳

△子供玩具整理に圖の様な自製の玩具箱は如何ですか。カタン絲の心棒を車に利用し、箱の前後に三個づつ取りつけて移動できるようなしものです。

材料はミカン(空箱)一個、カタン絲の心棒六個、太い針金二本、長さ四十センチ、幅三センチ位の板二枚です。作り方は、ミカン箱を美しい包装紙で貼り、次に二枚の板の兩端に穴をあけ、これを箱の兩側に釘で打ちつけます。次に、板の穴に、針金で車を三個づつ通します。