

防治性病與婦嬰安全

臺灣省性病防治中心

臺灣省衛生處在着手加強撲滅孕婦梅毒工作。根據估計臺灣每年出生的三〇〇、〇〇〇新生兒中至少有幾千患先天性梅毒。患有梅毒孕婦可能流產、或死產，即幸嬰兒足月降生，但全身為梅毒所侵亦難長成健全的人。先天性梅毒不但是嬰兒的不幸，同時也是家庭及社會的不幸。但是這不幸是能够預防的，假使母親在產前提供一點血液檢驗，可以知道有無梅毒。如患有梅毒立即開始注射幾針配尼西林，不但能救活嬰兒的生命，而且不致發生流產或死產，以致孕婦生命危險。全體孕婦若能協助此項工作先天梅毒一定減少而變成稀有的疾病。

普通患有梅毒的孕婦除了驗血結果呈陽性之外，也許沒有任何病徵。一點點血液的檢驗能知道有無梅毒。所以每一個孕婦都應該做一驗血，無論對於自己，嬰兒或是對於臺灣的衛生工作都有很大的貢獻。

梅毒驗血是免費的，並且對於患有梅毒的人不論孕婦、配偶及其兒童均免費治療。全省各其一個衛生院，衛生所和公立醫院都應協助性病防治工作。如果所有的開業醫師和助產士亦能協助並勸導全部孕婦施行驗血和治療，先天梅毒一定會被撲滅。


每個省民對於性病防治工作都有責任。凡是孕婦都應該趕快做一免費驗血。

天真話

玻璃蛋：
現在是玻璃世界，有什麼玻璃布，玻璃皮包，玻璃襪子，連孩子都知道一切玻璃化了。

前天請客桌上放着一盤皮蛋，六歲的妹妹看見了說：「美國人沒有我們有本事！」我問她：「為什麼？」她連忙說：「你看！我們還會做玻璃蛋吃呢！」

玻璃器具的保護法



玻璃器具比較容易破裂，在冷天不能用開水忽然的沖進去，一定要先用一點開水（滾水）在裡面搖一下，再另沖開水進去，那麼就不會因一部分突然受熱而破裂。相反的如在熱天吃冰也是一樣。

玻璃杯買來先放在冷水中煮至開（滾）冷後再拿出來使用，這樣比較會經久些。

用鹽可以洗得很乾淨。如浸於熱肥皂水（滾水）中，用灰水或肥皂水煮才能洗乾淨。不過這時候應注意，要在水冷時放進去煮，煮一會以後要等水冷時，再取出來拭乾才不會炸裂。

深杯或瓶子，用力搖動，可以洗得乾淨。用濕抹布去揩，瓶中，加水小許，用力搖動，可以洗得乾淨。用濕抹布去揩，布的絨毛會粘在上面，所以不能用濕布去擦，等乾了之後再用乾布揩淨。但是如用麻織的抹布就不會這樣了。

洗時薄的杯子應該一個一個分開的放進水裡去洗，不要一次泡上好幾個以免碰壞，如能鋪一毛巾於水底，更為安全。



家庭常識

問：小孩滿二歲，不要吃飯，怎麼辦？

答：（嘉義縣吳素錦）

「吃」的習慣基礎，是在嬰兒時期建立的。在初期孩子繼續或開始拒絕好好的吃東西，而沒有疾病或其他不正常情形時，應按時給他吃飯，隨他意吃，多或少都可。他一表示不吃，或開始玩時，不管他吃了多少，應立刻將食物拿開不給他吃，同時不可讓孩子知道家人因他不吃而焦慮失望等情形。

每次吃飯這樣實行，要注意在兩餐間，除水外絕對不給孩子其他食物吃，幾星期後或幾個月以後，他就會有較好的飲食習慣了。在訓練期中孩子體重可能減輕，這是無關緊要的，祇要他開始適當的「吃」，那麼很快就會恢復體重的。

實行這種策略是不容易的，母親要有決心，而且忍痛的慎重，耐心的去訓練孩子，使他知道他吃與不吃並沒有人注意，同時兩餐間沒有零食，那不久就自然地，好好地吃飯了。當然這策略不是使一個天生食量小的孩子，改變成一個大食量的孩子。

問：孩子吮指有害處嗎？怎樣制止呢？（新埔郭月娥）

答：嬰兒吮指如成習慣，會造成乳齒被推得參差不齊，上顎，牙床和口的形狀以及恒齒都可能成畸形，所以不能不注意。這種習慣在學齡以前必須用某種方法制止，但孩子情緒上的緊張應該除去。體罰，嘲笑，不停的責罵不僅不能發生效果，往往使孩子的注意力反而集中在吮指上。

在吮指時，姆指（這習慣）的習慣上，我們對這件事是希望他忘記，所以盡量使孩子的手有事做，就是有些東西可玩，



明七暗七 這遊戲是報數的遊戲，報得愈快愈好玩，有三四個人就可以玩了。

玩時大家圍坐一圈，由一人起頭報一、二、三……順序下去，但輪到報有「七」及「七」的倍數時，就要用拍掌代替報數，「七」、「十四」、「二十一」……及「二十八」……等數時，都不能報出此數，只是用手拍掌一記，下面的人仍得繼續報下去，誰報錯了，拍錯了都要受罰的。

如當他在吮手指時，你給他一片紙或布去玩，轉移他的注意力，那麼他就會忘記這個習慣了，久之他會忘記這個習慣的。（編者答）

問：孩子乳牙不好，會影響他的恒齒嗎？（基隆張阿海）

答：如果孩子飲食均衡，那麼恒齒是不會壞的。每天應吃牛乳豆漿及豆腐，許多綠色蔬菜以及魚肝油等。（編者答）

問：多吃糖是不是會使牙齒不健全？（左營李娥）

答：糖並不會使牙齒不健全，而是吃糖以後，若不漱口，口中因溫度濕度的關係，發酵產生一種酸性物質而腐蝕牙齒，使牙齒健全有影響，所以在吃過糖及食物以後要漱口，尤其是睡覺以前的一次更為重要。（編者答）

