

長官 狀元 英賦敏



不是我當年教學利字，那理有教差御史。

御史瞞目，毫不生氣，以筆在旁對曰：「誰知你今日任事衙門，這處無利見對門，不覺，唉，唉，唉。」



御史命親信，將銀三千，暗藏於任事箱籠，派差役護送，小心侍候，不得疏忽，回來受償。



御史命親信，將銀三千，暗藏於任事箱籠，派差役護送，小心侍候，不得疏忽，回來受償。



任事一路，實不絕口，差役隨時勸慰。



任事一路，實不絕口，差役隨時勸慰。



任事一路，實不絕口，差役隨時勸慰。

（上接第十一頁「牛的疾病和治療法」）

皮膚面變狀，很容易診斷。防治：特別注意飼料，尤其維他命類和無機物飼料，更應當注意給與。日光浴也不可缺少，脫毛部份，可塗擦樟腦精，收效很好。

四、象皮病
病原：絲狀蟲（ミクロワイヤ）的寄生。
病狀：由牛的額面、頭下面、胸垂、腋下、膝、乳房、尾根等部開始，嚴重時全身脫毛，皮膚厚而感覺痒，局部患這症時，和象的皮膚相仿。

治療法：用吐酒石鈉溶液（吐酒石ナトリウム溶液）靜脈注射，體重每百公斤用〇・二—〇・三公分，每日或隔日注射一次。注射數次，可得到很好效果。


五、蟲
蟲易寄生在牛的頸部，頭部被毛中，成蟲可用DDT石油溶液殺死，但蟲卵不容易完全死滅，須隔七—十日後再塗藥，連續三回，可完全殺死。

六、牛壁蝨
多寄生在放牧牛體上，寄生部位多在牛的會陰部、乳房、頸下、腋下、額面等皮膚較軟部份。少數寄生可用手除去，寄生數量多時，可用亞砒酸、木溜油、炭酸蘇達等水混合液驅除。放牧地每隔三年或四年休息一次，牛壁蝨的發生，即可減少。

（五）其他的內科疾病

一、熱射病
病原：氣候燥熱，過勞，飲水不充分等原因，或放牧場不通風，強烈的日光照射，或在夏季用車船運輸耕牛，最容易發生這病。
病狀：呼吸迫促，身體發高熱，脈搏頻數微弱，結膜充血，食慾不振，反芻停止，精神萎靡。
治療法：冷水灌腸，注射強心劑，頭部覆以濕冷布，灌服清水，趕快牽到蔭涼地方休息（圖三）並用冷水沖洗牛體。

二、創傷性心臟炎
這症與創傷性胃橫膈膜炎併發，病狀持續時，心臟部份用力壓迫，有疼痛的感覺，脈搏微弱，營養不良，呼吸很困難。診斷確係這種病時，最好早日屠殺。



（三圖）發熱射病候牛，趕快牽。到涼地方休息。