



長官 畫 狀元 蘇賦敏

不是我當年教學利字
那裡有教差御史。

御史瞞目，毫不生氣，以筆在旁對
曰：「誰知你今日任事衙門，這處無國
利先生，次晨任事，東巷社道開門
見對門，不覺，唉，唉，唉，氣。」

御史命親信，
將銀三千，暗
藏於任
事箱籠
派差役
護送，囑
付沿途小
心侍候，不
得疏忽，
回來受賞。

任事一路
買不飽口，
差役隨時
勸慰。

行抵家門，差
役敢回同轉，
任事手批
任口一路
勞苦，酒德，
今皆在念
飲杯米酒，
用銀粗
飯，晚間
叙，仁義
道，便，有何
妨教？

差役曰：「任事素為御史，為官嚴
律，小手不敢逾限
消差，必須
星夜趕回，
否則一打
二革，担
當不起。
且言疾走，
任事欲追，
望塵莫
及。」

多寄生在放牧牛體上，寄生部
位多在牛的會陰部、乳房、頸下、
腋下、額面等皮膚較軟部份。少數
寄生可用手除去，寄生數量多時，
可用亞砒酸、木溜油、炭酸蘇達等
水混合液驅除。放牧地每隔三年或
四年休息一次，牛壁蝨的發生，即
可減少。

（上接第十一頁「牛的疾病和治
療法」）

皮膚面變狀，很容易診斷。
防治：特別注意飼料，尤其維他命
類和無機物飼料，更應當注意給
與。日光浴也不可缺少，脫毛部
份，可塗擦樟腦精，收效很好。

四、象皮病

病原：絲狀蟲（ミクロフィラリヤ）
的寄生。
病狀：由牛的額面、頭下面、胸垂
、腋下、膝、乳房、尾根等部開
始，嚴重時全身脫毛，皮膚厚而
感覺痒，局部患這症時，和象的
皮膚相仿。

治療法：用吐酒石鈉溶液（吐酒
石ナトリウム溶液）靜脈注射
，體重每百公斤用〇・二一〇・
三分，每日或隔日注射一次
。注射數次，可得到很好效
果。

五、蟲

蟲易寄生在牛的頸部，頭部
被毛中，成蟲可用DDT石油溶
液殺死，但蟲卵不容易完全死滅
，須隔七、十日後再塗藥，連續
三回，可完全殺死。

六、牛壁蝨


多寄生在放牧牛體上，寄生部
位多在牛的會陰部、乳房、頸下、
腋下、額面等皮膚較軟部份。少數
寄生可用手除去，寄生數量多時，
可用亞砒酸、木溜油、炭酸蘇達等
水混合液驅除。放牧地每隔三年或
四年休息一次，牛壁蝨的發生，即
可減少。

（五）其他的內科
疾病

一、熱射病

病原：氣候燥熱，過勞，飲水不充
分等原因，或放牧場不通風，強
烈的日光照射，或在夏季用車船
運輸耕牛，最容易發生這病。
病狀：呼吸迫促，身體發高熱，脈
搏頻數微弱，結膜充血，食慾不
振，反芻停止，精神萎靡。

治療法：冷水灌腸，注射強心劑，
頭部覆以濕冷布，灌服清水，趕
快牽到蔭涼地方休息（圖三）並
用冷水沖洗牛體。



（三圖）發熱射病候牛，趕快牽到涼地方休息。

二、創傷性心臟炎

這症與創傷性胃橫膈膜炎併發
，病狀持續時，心臟部份用力壓迫
，有疼痛的感覺，脈搏微弱，營養
不良，呼吸很困難。診斷確係這種
病時，最好早日屠殺。
（未完，下期續）