

鳳梨種苗的種要理處

滿雙張 所分驗試藝園帶熱山鳳

鳳梨種苗的好壞，影響鳳梨栽培的成敗，關係很大。選擇好苗栽培，事半功倍，株株結實，可得豐產。

好的鳳梨種苗要具備些什麼條件？如何才能得到好的種苗呢？下面列述幾種比較重要的處理事項，希望做為參考。

(一) 好苗應具備些什麼條件？

鳳梨的芽體有冠芽、裔芽、吸芽、塊莖芽等，以下所談的，也

一般用做繁殖的，大部份是裔芽。以下各點：

① 苗體要壯大，苗高三公分以上，葉片無刺。

② 形狀正常，無偏倚的。

③ 強健而無病蟲害的。

(二) 如何能產生好苗？

① 每一母株應留多少苗？

多餘的苗何時除去？：優良無

刺開英種（スムース、カイエ）所發生的裔芽很少（約一



(三) 如何處理種苗？

① 種苗的乾燥：一般鳳梨苗沒有乾燥，種植後發根生長也都可以。但種苗乾燥最少有害的發生，種植前種苗要經過燻蒸。燻蒸時種苗若沒有晾乾，很容易發生藥害。乾燥的程度以葉片不易折斷為度。（晴天約四、五天）另外一個目的，就是裝運或貯藏時可以防止

種苗的腐爛，遠途運輸時不必過度乾燥，要高些，短途運輸時不必淋濕，否則必發霉。

② 時期採苗：探苗時期要看裔芽的發育情形，旱燥，影響種苗的發育，採苗最適宜。

③ 採苗：探苗時期，與定植期之間探苗太早，種苗幼小，根生長。所以在八月中旬到九月上旬




(四) 其他注意事項

① 種苗大小應分別栽植：種苗要選大而強壯的，大小必需分別栽植。小苗栽植在坡下面的肥沃土地，大苗栽在坡的上面地力較差土地。這樣全園的植株生長可以整齊。

② 最好不要從有病的園採苗。

③ 種苗的搬運、發送等操作時，要十分細心，不要使種苗受傷折斷而腐爛。

④ 種苗放置時，不要堆積以致種苗酸酵腐爛。



生或貯藏時，嚴重的腐爛，遠途運輸時，不必過度乾燥，要高些，短途運輸時不必淋濕，否則必發霉。

下面兩個目的：一為防止病蟲害的發生，種植前種苗要經過燻蒸。燻蒸時種苗若沒有晾乾，很容易發生藥害。乾燥的程度以葉片不易折斷為度。（晴天約四、五天）另外一個目的，就是裝運或貯藏時可以防止

種苗的腐爛，遠途運輸時不必過度乾燥，要高些，短途運輸時不必淋濕，否則必發霉。

（三株最好選這種除芽，一般栽培的，但是現在統一大部份是有系統的，多的時候有十幾株，南部或五月底或五月初在鳳梨開花後十天左右（南部約在四月底或五月初），留果柄中間散發育，發育良好的裔芽二十三個，其餘全部除去，以促進保留芽的發育。除芽時操作要小心，不要傷果實。

（四）操作次數，損傷種苗較少。（圖二）

（五）母株上晾乾法：採苗同時把種苗倒立於母株上，晾乾四、五天後收集燻蒸，工作方便，減少損傷。

（六）種苗的燻蒸：為防止可怕的鳳梨萎凋病的發生，種苗必需燻蒸，殺死傳染這病的粉介殼蟲。燻蒸的藥劑，可以用氯化鈣或氯化鋅。新近用溴化甲烷燻蒸，效果大藥害少，最為理想。燻蒸工作要有適當的設備和經驗，一般農戶燻蒸時，最好請附近鳳梨公司農場，或試驗機關協助指導。