



△農藝▽

水稻出穗不整齊 插秧施肥有關係
水稻出穗不整齊，插秧施肥有關係，水插秧大穗小，注意改善地方，插秧時田水，可促穗早熟，甘藷蔓苗若剪定，多生嫩芽繁殖快。

△土壤肥料▽

爲何製造好堆肥須要踏實又通風？
何以太陽曬結實少？想是蟲害與乾燥。

△病蟲害▽

防治桃粉蚜 請用魚藤劑
夏季種蔬菜 多施有機肥
衣笠菜豆品質佳 市場歡迎銷路好
香雞雞珠整理好 新芽快長結果早
要便香雞生長快 注意施用適當肥

△畜牧▽

牛尾濕疹注意治療 若要治療須先
公牛角開弄光頭毛 防開
產下仔更有盲目 可能缺乏維他命
△家畜▽
臺灣現有家畜約九百萬隻
軍餉雙眼淚不止 地微素膏可療治

農藝



水田排熟稻

期，爲什麼要注意田面
排水？排水後對於水稻
有何利益？（新竹縣
湖口鄉彭武金）

水田排熟稻

期，爲什麼要注意田面
排水？排水後對於水稻
有何利益？（新竹縣
湖口鄉彭武金）

水田排熟稻

期，爲什麼要注意田面
排水？排水後對於水稻
有何利益？（新竹縣
湖口鄉彭武金）

水田排熟稻

期，爲什麼要注意田面
排水？排水後對於水稻
有何利益？（新竹縣
湖口鄉彭武金）

水田排熟稻

期，爲什麼要注意田面
排水？排水後對於水稻
有何利益？（新竹縣
湖口鄉彭武金）

水田排熟稻

期，爲什麼要注意田面
排水？排水後對於水稻
有何利益？（新竹縣
湖口鄉彭武金）

水田排熟稻

期，爲什麼要注意田面
排水？排水後對於水稻
有何利益？（新竹縣
湖口鄉彭武金）

，這樣可以抑制它的營養生長，促進稻穗成熟，否則，會延遲成熟期。（省農業試驗所穆進三）

水稻出穗不整齊

問：水稻出穗不整齊是什麼原因？（新竹市莊國泰）

答：水稻出穗不整齊的原因有：
一、插秧太遲，致秧苗過於老熟；
二、追肥施得太晚發生晚期分蘖；
三、插秧的支數不平均。
（臺中區農林改良場余慶東）

水稻株大穗小

注意改善地力

問：水稻株大而穗短小是什麼原因？（莊國泰）
答：水稻株大而穗短小的原因，是由於分蘖盛期以後的缺乏肥份。所以應該注意事先保養地力，如實行深耕，種綠肥，多施堆肥，並行全層施肥等。（余慶東）

甘藷蔓苗若剪定

多生腋芽繁殖快

問：豐年六月份農家月曆中所載，甘藷扦插後十五天剪定諸蔓，這是什麼原因？有什麼利點？（彭武金）
答：甘藷在育苗時剪定，能使諸蔓發生腋芽，增加苗數，以利繁殖。本田也有行剪定的，目的爲養豬飼料用，可以增加葉葉的生產量。（嘉義農業試驗分所楊景濤）（請參看本刊四卷六期「甘藷怎樣育苗」）

土壤肥料

刊四卷六期「甘藷怎樣育苗」

爲何製造好堆肥須要踏實又通風？
何以太陽曬結實少？想是蟲害與乾燥。

肥堆好造製何爲

風通又實踏要須

問：堆肥中有機物的分解，是由於好氣性細菌的作用，還是嫌氣性細菌的作用？爲什麼性細菌的作用？又要在底部通風？（南投鎮陳豐源）（嘉義市黃萬枝）
答：製造良好的堆肥有兩個要點：
①使粗硬的有機物迅速分解，成爲勻細柔軟，使在短期內得到腐熟而便於應用的有機肥。
②在分解過程中須防止有機質的損失——變爲水分和二氧化碳，以及有效性氮磷鉀三要素的流失，尤其是氮素。

何以太陽曬結實少？

想是蟲害與乾燥

問：在去年秋天，我種了一些太陽麻，在黃粉沙地生長優良，開花旺盛，但結實不多，這是什麼原因？（虎尾鎮廖東村）
答：太陽麻結實少的原因可能有下列各點：
①蟲害：早期播種的太陽麻約有百分之五十至六十被害蟲侵害。主要害蟲是綠肥螟蛾（シロイチモチジマダラメイガ）和豌豆小灰蝶（ウラナミシジミ）兩種，這兩種的幼蟲都能侵入莢果中食害種子。防治方面是延遲播種期到七至八月，發生時可噴撒10%DDT粉。但你是秋天種的，似乎

小啓

今後讀者們如來信詢問農業實際問題，請寫明詳細通信地址，和真實姓名，否則，恐無法答復。

病蟲害

問：我家種有桃樹，已生長四年，每年正、二月發新芽，發育很正，常。但是到三、四月開花結果的時候，新葉枝條上就發生嚴重的蟲害（附上蟲樣），以致結果不良。請問對這種蟲有什麼方法可以防治？（雲林縣元長鄉吳恆茂）

病蟲害

問：我家種有桃樹，已生長四年，每年正、二月發新芽，發育很正，常。但是到三、四月開花結果的時候，新葉枝條上就發生嚴重的蟲害（附上蟲樣），以致結果不良。請問對這種蟲有什麼方法可以防治？（雲林縣元長鄉吳恆茂）

病蟲害

問：我家種有桃樹，已生長四年，每年正、二月發新芽，發育很正，常。但是到三、四月開花結果的時候，新葉枝條上就發生嚴重的蟲害（附上蟲樣），以致結果不良。請問對這種蟲有什麼方法可以防治？（雲林縣元長鄉吳恆茂）

也很多。在這種情形下，分解作用應該予以抑制，抑止的方法便是壓實並加水，使堆積物中的空氣減少，好氣性細菌停止作用，而使嫌氣性細菌的作用起而代之。嫌氣性細菌在比較低溫的時候能够繁殖，使有機物和氮的損失減少。

土壤肥料

刊四卷六期「甘藷怎樣育苗」

通常製造堆肥時分①假積和②本積兩個階段。前一階段在使空氣流通，縮短分解腐熟的時間，以好氣性細菌爲主；後一階段在抑制空氣流通，以保存有機物和肥料成分，以促進嫌氣性細菌的作用爲主。所以製造堆肥的時候，有時需要空氣流通，有時需要抑制通氣，各有目的，並不是矛盾。（省農業試驗所張守敬）

何以太陽曬結實少？

想是蟲害與乾燥

問：在去年秋天，我種了一些太陽麻，在黃粉沙地生長優良，開花旺盛，但結實不多，這是什麼原因？（虎尾鎮廖東村）
答：太陽麻結實少的原因可能有下列各點：
①蟲害：早期播種的太陽麻約有百分之五十至六十被害蟲侵害。主要害蟲是綠肥螟蛾（シロイチモチジマダラメイガ）和豌豆小灰蝶（ウラナミシジミ）兩種，這兩種的幼蟲都能侵入莢果中食害種子。防治方面是延遲播種期到七至八月，發生時可噴撒10%DDT粉。但你是秋天種的，似乎

小啓

今後讀者們如來信詢問農業實際問題，請寫明詳細通信地址，和真實姓名，否則，恐無法答復。

病蟲害

問：我家種有桃樹，已生長四年，每年正、二月發新芽，發育很正，常。但是到三、四月開花結果的時候，新葉枝條上就發生嚴重的蟲害（附上蟲樣），以致結果不良。請問對這種蟲有什麼方法可以防治？（雲林縣元長鄉吳恆茂）

病蟲害

問：我家種有桃樹，已生長四年，每年正、二月發新芽，發育很正，常。但是到三、四月開花結果的時候，新葉枝條上就發生嚴重的蟲害（附上蟲樣），以致結果不良。請問對這種蟲有什麼方法可以防治？（雲林縣元長鄉吳恆茂）

病蟲害

問：我家種有桃樹，已生長四年，每年正、二月發新芽，發育很正，常。但是到三、四月開花結果的時候，新葉枝條上就發生嚴重的蟲害（附上蟲樣），以致結果不良。請問對這種蟲有什麼方法可以防治？（雲林縣元長鄉吳恆茂）

病蟲害

問：我家種有桃樹，已生長四年，每年正、二月發新芽，發育很正，常。但是到三、四月開花結果的時候，新葉枝條上就發生嚴重的蟲害（附上蟲樣），以致結果不良。請問對這種蟲有什麼方法可以防治？（雲林縣元長鄉吳恆茂）

病蟲害

問：我家種有桃樹，已生長四年，每年正、二月發新芽，發育很正，常。但是到三、四月開花結果的時候，新葉枝條上就發生嚴重的蟲害（附上蟲樣），以致結果不良。請問對這種蟲有什麼方法可以防治？（雲林縣元長鄉吳恆茂）

病蟲害

問：我家種有桃樹，已生長四年，每年正、二月發新芽，發育很正，常。但是到三、四月開花結果的時候，新葉枝條上就發生嚴重的蟲害（附上蟲樣），以致結果不良。請問對這種蟲有什麼方法可以防治？（雲林縣元長鄉吳恆茂）

病蟲害

問：我家種有桃樹，已生長四年，每年正、二月發新芽，發育很正，常。但是到三、四月開花結果的時候，新葉枝條上就發生嚴重的蟲害（附上蟲樣），以致結果不良。請問對這種蟲有什麼方法可以防治？（雲林縣元長鄉吳恆茂）

病蟲害

問：我家種有桃樹，已生長四年，每年正、二月發新芽，發育很正，常。但是到三、四月開花結果的時候，新葉枝條上就發生嚴重的蟲害（附上蟲樣），以致結果不良。請問對這種蟲有什麼方法可以防治？（雲林縣元長鄉吳恆茂）

病蟲害

問：我家種有桃樹，已生長四年，每年正、二月發新芽，發育很正，常。但是到三、四月開花結果的時候，新葉枝條上就發生嚴重的蟲害（附上蟲樣），以致結果不良。請問對這種蟲有什麼方法可以防治？（雲林縣元長鄉吳恆茂）

病蟲害

問：我家種有桃樹，已生長四年，每年正、二月發新芽，發育很正，常。但是到三、四月開花結果的時候，新葉枝條上就發生嚴重的蟲害（附上蟲樣），以致結果不良。請問對這種蟲有什麼方法可以防治？（雲林縣元長鄉吳恆茂）

病蟲害

問：我家種有桃樹，已生長四年，每年正、二月發新芽，發育很正，常。但是到三、四月開花結果的時候，新葉枝條上就發生嚴重的蟲害（附上蟲樣），以致結果不良。請問對這種蟲有什麼方法可以防治？（雲林縣元長鄉吳恆茂）

病蟲害

問：我家種有桃樹，已生長四年，每年正、二月發新芽，發育很正，常。但是到三、四月開花結果的時候，新葉枝條上就發生嚴重的蟲害（附上蟲樣），以致結果不良。請問對這種蟲有什麼方法可以防治？（雲林縣元長鄉吳恆茂）

病蟲害

問：我家種有桃樹，已生長四年，每年正、二月發新芽，發育很正，常。但是到三、四月開花結果的時候，新葉枝條上就發生嚴重的蟲害（附上蟲樣），以致結果不良。請問對這種蟲有什麼方法可以防治？（雲林縣元長鄉吳恆茂）

病蟲害

問：我家種有桃樹，已生長四年，每年正、二月發新芽，發育很正，常。但是到三、四月開花結果的時候，新葉枝條上就發生嚴重的蟲害（附上蟲樣），以致結果不良。請問對這種蟲有什麼方法可以防治？（雲林縣元長鄉吳恆茂）



夏季蔬菜施肥多

問：夏季蔬菜苗床和園地多施有機質肥料和草木灰，不知有什麼好處？（新竹縣彭武金）

答：因為夏季高溫多雨，無論苗床或園地都容易發生土壤溫度過高，有害於根部的發育，土壤中的水分含量也易於起急變。天晴的時候怕容易乾燥，天雨的時候又嫌太濕，土壤容易被冲刷，肥料容易流失。雨後的土壤結實板滯，通氣不良，妨害種子發芽和根部的發育，更影響肥分和水分的吸收。這時如果多施有機質肥料（主要指腐熟的堆肥）可以改善土壤的物理性，使土壤溫度不致於過份昇高，使土壤疏鬆膨軟成多孔性而助長根部發育；又能使土壤保持適宜的水分，晴天不至於急速乾燥，雨天也不至於過濕和緊實固結。再說有機質肥料的肥分是可以慢慢分解，逐漸被植物吸收利用，不會像化學肥料的肥分容易流失。

多施草木灰是可以防止種子在播種後遇雨發生腐爛，又可以使土壤疏鬆，因而使植物生長強健，減少病害。（鳳山熱帶園藝試驗分所郁宗雄）

「衣笠」菜豆品質佳

市場歡迎銷路好

問：①本省栽培的菜豆（敏豆）中，有一種種子白色的蔓性種，叫做什麼品種？

②用途和銷路怎樣？（嘉義縣中埔鄉林騰）

答：「衣笠」（原名 White Creasback），是目下臺灣菜豆中栽培最普遍的品種。這種是蔓性的，早生豐產，開白花，嫩莢綠色，莢形端正圓，肉厚，沒有筋，莢質柔嫩無纖維，而且不容易變得粗老，種子白色長圓，是一種優良品種。

②「衣笠」種菜豆莢形優美，品質佳良，所以是最受市場歡迎的莢用品種，適於煮炒。銷路確實，外銷也有希望。（郁宗雄）

香蕉殘株整理好

新芽快長結果早

問：香蕉在收穫以後，應該怎樣整理根部部份，以維持吸芽（苗子）生長？（宜蘭縣三星鄉陳耀仁）

答：收穫後的殘株（已收穫的老株留一五公尺的高度，把上面的莖葉切下，覆蓋在植株周圍，可以增加肥分，並有防旱的功効。留下這相當高度殘株的作用，是使它內部的營養物流入塊莖（根頭），供應吸芽（苗子）生長所需要的養分。吸芽僅留生長優良的一株，多餘的都應該除掉。（嘉義農業試驗分所朱慶國）

要使香蕉生長快

注意施用適當肥

問：香蕉要怎樣施肥，可以使它長得豐滿？（陳耀仁）

答：要使香蕉生長優良，必須施用適當肥料。鉀素肥料尤其重要（一般蕉農多單施氮

肥機有施多

問：夏季蔬菜苗床和園地多施有機質肥料和草木灰，不知有什麼好處？（新竹縣彭武金）

答：因為夏季高溫多雨，無論苗床或園地都容易發生土壤溫度過高，有害於根部的發育，土壤中的水分含量也易於起急變。天晴的時候怕容易乾燥，天雨的時候又嫌太濕，土壤容易被冲刷，肥料容易流失。雨後的土壤結實板滯，通氣不良，妨害種子發芽和根部的發育，更影響肥分和水分的吸收。這時如果多施有機質肥料（主要指腐熟的堆肥）可以改善土壤的物理性，使土壤溫度不致於過份昇高，使土壤疏鬆膨軟成多孔性而助長根部發育；又能使土壤保持適宜的水分，晴天不至於急速乾燥，雨天也不至於過濕和緊實固結。再說有機質肥料的肥分是可以慢慢分解，逐漸被植物吸收利用，不會像化學肥料的肥分容易流失。

多施草木灰是可以防止種子在播種後遇雨發生腐爛，又可以使土壤疏鬆，因而使植物生長強健，減少病害。（鳳山熱帶園藝試驗分所郁宗雄）

「衣笠」菜豆品質佳

市場歡迎銷路好

問：①本省栽培的菜豆（敏豆）中，有一種種子白色的蔓性種，叫做什麼品種？

②用途和銷路怎樣？（嘉義縣中埔鄉林騰）

答：「衣笠」（原名 White Creasback），是目下臺灣菜豆中栽培最普遍的品種。這種是蔓性的，早生豐產，開白花，嫩莢綠色，莢形端正圓，肉厚，沒有筋，莢質柔嫩無纖維，而且不容易變得粗老，種子白色長圓，是一種優良品種。

②「衣笠」種菜豆莢形優美，品質佳良，所以是最受市場歡迎的莢用品種，適於煮炒。銷路確實，外銷也有希望。（郁宗雄）

香蕉殘株整理好

新芽快長結果早

問：香蕉在收穫以後，應該怎樣整理根部部份，以維持吸芽（苗子）生長？（宜蘭縣三星鄉陳耀仁）

答：收穫後的殘株（已收穫的老株留一五公尺的高度，把上面的莖葉切下，覆蓋在植株周圍，可以增加肥分，並有防旱的功効。留下這相當高度殘株的作用，是使它內部的營養物流入塊莖（根頭），供應吸芽（苗子）生長所需要的養分。吸芽僅留生長優良的一株，多餘的都應該除掉。（嘉義農業試驗分所朱慶國）

要使香蕉生長快

注意施用適當肥

問：香蕉要怎樣施肥，可以使它長得豐滿？（陳耀仁）

答：要使香蕉生長優良，必須施用適當肥料。鉀素肥料尤其重要（一般蕉農多單施氮

肥機有施多

問：夏季蔬菜苗床和園地多施有機質肥料和草木灰，不知有什麼好處？（新竹縣彭武金）

答：因為夏季高溫多雨，無論苗床或園地都容易發生土壤溫度過高，有害於根部的發育，土壤中的水分含量也易於起急變。天晴的時候怕容易乾燥，天雨的時候又嫌太濕，土壤容易被冲刷，肥料容易流失。雨後的土壤結實板滯，通氣不良，妨害種子發芽和根部的發育，更影響肥分和水分的吸收。這時如果多施有機質肥料（主要指腐熟的堆肥）可以改善土壤的物理性，使土壤溫度不致於過份昇高，使土壤疏鬆膨軟成多孔性而助長根部發育；又能使土壤保持適宜的水分，晴天不至於急速乾燥，雨天也不至於過濕和緊實固結。再說有機質肥料的肥分是可以慢慢分解，逐漸被植物吸收利用，不會像化學肥料的肥分容易流失。

多施草木灰是可以防止種子在播種後遇雨發生腐爛，又可以使土壤疏鬆，因而使植物生長強健，減少病害。（鳳山熱帶園藝試驗分所郁宗雄）

「衣笠」菜豆品質佳

市場歡迎銷路好

問：①本省栽培的菜豆（敏豆）中，有一種種子白色的蔓性種，叫做什麼品種？

②用途和銷路怎樣？（嘉義縣中埔鄉林騰）

答：「衣笠」（原名 White Creasback），是目下臺灣菜豆中栽培最普遍的品種。這種是蔓性的，早生豐產，開白花，嫩莢綠色，莢形端正圓，肉厚，沒有筋，莢質柔嫩無纖維，而且不容易變得粗老，種子白色長圓，是一種優良品種。

②「衣笠」種菜豆莢形優美，品質佳良，所以是最受市場歡迎的莢用品種，適於煮炒。銷路確實，外銷也有希望。（郁宗雄）

香蕉殘株整理好

新芽快長結果早

問：香蕉在收穫以後，應該怎樣整理根部部份，以維持吸芽（苗子）生長？（宜蘭縣三星鄉陳耀仁）

答：收穫後的殘株（已收穫的老株留一五公尺的高度，把上面的莖葉切下，覆蓋在植株周圍，可以增加肥分，並有防旱的功効。留下這相當高度殘株的作用，是使它內部的營養物流入塊莖（根頭），供應吸芽（苗子）生長所需要的養分。吸芽僅留生長優良的一株，多餘的都應該除掉。（嘉義農業試驗分所朱慶國）

要使香蕉生長快

注意施用適當肥

問：香蕉要怎樣施肥，可以使它長得豐滿？（陳耀仁）

答：要使香蕉生長優良，必須施用適當肥料。鉀素肥料尤其重要（一般蕉農多單施氮

肥機有施多

問：夏季蔬菜苗床和園地多施有機質肥料和草木灰，不知有什麼好處？（新竹縣彭武金）

答：因為夏季高溫多雨，無論苗床或園地都容易發生土壤溫度過高，有害於根部的發育，土壤中的水分含量也易於起急變。天晴的時候怕容易乾燥，天雨的時候又嫌太濕，土壤容易被冲刷，肥料容易流失。雨後的土壤結實板滯，通氣不良，妨害種子發芽和根部的發育，更影響肥分和水分的吸收。這時如果多施有機質肥料（主要指腐熟的堆肥）可以改善土壤的物理性，使土壤溫度不致於過份昇高，使土壤疏鬆膨軟成多孔性而助長根部發育；又能使土壤保持適宜的水分，晴天不至於急速乾燥，雨天也不至於過濕和緊實固結。再說有機質肥料的肥分是可以慢慢分解，逐漸被植物吸收利用，不會像化學肥料的肥分容易流失。

多施草木灰是可以防止種子在播種後遇雨發生腐爛，又可以使土壤疏鬆，因而使植物生長強健，減少病害。（鳳山熱帶園藝試驗分所郁宗雄）

「衣笠」菜豆品質佳

市場歡迎銷路好

問：①本省栽培的菜豆（敏豆）中，有一種種子白色的蔓性種，叫做什麼品種？

②用途和銷路怎樣？（嘉義縣中埔鄉林騰）

答：「衣笠」（原名 White Creasback），是目下臺灣菜豆中栽培最普遍的品種。這種是蔓性的，早生豐產，開白花，嫩莢綠色，莢形端正圓，肉厚，沒有筋，莢質柔嫩無纖維，而且不容易變得粗老，種子白色長圓，是一種優良品種。

②「衣笠」種菜豆莢形優美，品質佳良，所以是最受市場歡迎的莢用品種，適於煮炒。銷路確實，外銷也有希望。（郁宗雄）

香蕉殘株整理好

新芽快長結果早

問：香蕉在收穫以後，應該怎樣整理根部部份，以維持吸芽（苗子）生長？（宜蘭縣三星鄉陳耀仁）

答：收穫後的殘株（已收穫的老株留一五公尺的高度，把上面的莖葉切下，覆蓋在植株周圍，可以增加肥分，並有防旱的功効。留下這相當高度殘株的作用，是使它內部的營養物流入塊莖（根頭），供應吸芽（苗子）生長所需要的養分。吸芽僅留生長優良的一株，多餘的都應該除掉。（嘉義農業試驗分所朱慶國）

要使香蕉生長快

注意施用適當肥

問：香蕉要怎樣施肥，可以使它長得豐滿？（陳耀仁）

答：要使香蕉生長優良，必須施用適當肥料。鉀素肥料尤其重要（一般蕉農多單施氮

肥機有施多

問：夏季蔬菜苗床和園地多施有機質肥料和草木灰，不知有什麼好處？（新竹縣彭武金）

答：因為夏季高溫多雨，無論苗床或園地都容易發生土壤溫度過高，有害於根部的發育，土壤中的水分含量也易於起急變。天晴的時候怕容易乾燥，天雨的時候又嫌太濕，土壤容易被冲刷，肥料容易流失。雨後的土壤結實板滯，通氣不良，妨害種子發芽和根部的發育，更影響肥分和水分的吸收。這時如果多施有機質肥料（主要指腐熟的堆肥）可以改善土壤的物理性，使土壤溫度不致於過份昇高，使土壤疏鬆膨軟成多孔性而助長根部發育；又能使土壤保持適宜的水分，晴天不至於急速乾燥，雨天也不至於過濕和緊實固結。再說有機質肥料的肥分是可以慢慢分解，逐漸被植物吸收利用，不會像化學肥料的肥分容易流失。

多施草木灰是可以防止種子在播種後遇雨發生腐爛，又可以使土壤疏鬆，因而使植物生長強健，減少病害。（鳳山熱帶園藝試驗分所郁宗雄）

「衣笠」菜豆品質佳

市場歡迎銷路好

問：①本省栽培的菜豆（敏豆）中，有一種種子白色的蔓性種，叫做什麼品種？

②用途和銷路怎樣？（嘉義縣中埔鄉林騰）

答：「衣笠」（原名 White Creasback），是目下臺灣菜豆中栽培最普遍的品種。這種是蔓性的，早生豐產，開白花，嫩莢綠色，莢形端正圓，肉厚，沒有筋，莢質柔嫩無纖維，而且不容易變得粗老，種子白色長圓，是一種優良品種。

②「衣笠」種菜豆莢形優美，品質佳良，所以是最受市場歡迎的莢用品種，適於煮炒。銷路確實，外銷也有希望。（郁宗雄）

香蕉殘株整理好

新芽快長結果早

問：香蕉在收穫以後，應該怎樣整理根部部份，以維持吸芽（苗子）生長？（宜蘭縣三星鄉陳耀仁）

答：收穫後的殘株（已收穫的老株留一五公尺的高度，把上面的莖葉切下，覆蓋在植株周圍，可以增加肥分，並有防旱的功効。留下這相當高度殘株的作用，是使它內部的營養物流入塊莖（根頭），供應吸芽（苗子）生長所需要的養分。吸芽僅留生長優良的一株，多餘的都應該除掉。（嘉義農業試驗分所朱慶國）

要使香蕉生長快

注意施用適當肥

問：香蕉要怎樣施肥，可以使它長得豐滿？（陳耀仁）

答：要使香蕉生長優良，必須施用適當肥料。鉀素肥料尤其重要（一般蕉農多單施氮



家畜醫藥

問：①本省的養雞業情況怎樣？

②這幾年來雞蛋價格的波動如何？（高雄市楠梓區李明祥）

答：①本省養雞事業，多數是農村家庭副業，經營雞場供應種雞和種蛋的，雞種以洋種的為多。本省全省家禽總共約有九百萬隻，雞的數目約佔全數的三分之二。

②在本省，雞蛋的價格可算相當高。價格除了因季節性的波動外（產蛋少的季節如秋冬，即價格較高），其餘時間波動很少。（李登元）

軍鴿雙眼淚不止

地微素膏可療治

問：我家有幾十隻軍鴿，其中有二隻，雙眼時常流着眼淚，至今已有一個月多月，請問有什麼治療方法？（嘉義縣大林鎮張長鴻）

答：你的軍鴿雙眼淚流，可試用「地微素膏」（Tere-mycin ointment）每日塗眼一次，塗三、四次就能治癒。（省農業試驗所李登元）

公牛角門弄光頭毛

若要治療須先防門

問：我家有一頭公牛，由於牠好角力的關係，把頭上的毛差不多都弄光了，到現在約有三年多，一直沒生過，所以難看得很。有人是不願意有這種牛。請問怎樣才能使牠頭上的毛重生呢？聽說現在有一種藥抹上去，就能生毛，有這回事麼？（高雄縣美濃鎮鍾得源）

答：你首先要防止這頭牛不再角鬥，因為脫毛部位如有傷口，痊癒後就不容易生毛。

治療可用皮膚刺激藥，如芫青面一分，酒精五分混合，塗擦脫毛部位，略可促進發毛。（任善榮）

產下仔兔有盲目

可能缺乏維他命

問：我家飼有母兔一隻，每次生產小免，必定有一兩隻盲目的。如果換用別種系統的公兔交配，就沒有這種現象。請問這是什麼原因？（北港糖廠吳雄）

答：仔兔盲目的原因，大致有二：（一）缺少維他命A（二）異物傷害（隻眼失明現象）。至於盲目的遺傳現象，目前還沒有見到那一種動物有這種先例。來信並沒有把育目的詳情說明，所以無法肯定答覆你。（國立臺灣大學畜牧獸醫系陳立治）

窩家有現灣臺

雙萬百九共約

業情況怎樣？

②這幾年來雞蛋價格的波動如何？（高雄

家畜醫藥

問：①本省的養雞業情況怎樣？

②這幾年來雞蛋價格的波動如何？（高雄

公牛角門弄光頭毛

若要治療須先防門

問：我家有一頭公牛，由於牠好角力的關係，把頭上的毛差不多都弄光了，到現在約有三年多，一直沒生過，所以難看得很。有人是不願意有這種牛。請問怎樣才能使牠頭上的毛重生呢？聽說現在有一種藥抹上去，就能生毛，有這回事麼？（高雄縣美濃鎮鍾得源）

答：你首先要防止這頭牛不再角鬥，因為脫毛部位如有傷口，痊癒後就不容易生毛。

治療可用皮膚刺激藥，如芫青面一分，酒精五分混合，塗擦脫毛部位，略可促進發毛。（任善榮）

產下仔兔有盲目

可能缺乏維他命

問：我家飼有母兔一隻，每次生產小免，必定有一兩隻盲目的。如果換用別種系統的公兔交配，就沒有這種現象。請問這是什麼原因？（北港糖廠吳雄）

答：仔兔盲目的原因，大致有二：（一）缺少維他命A（二）異物傷害（隻眼失明現象）。至於盲目的遺傳現象，目前還沒有見到那一種動物有這種先例。來信並沒有把育目的詳情說明，所以無法肯定答覆你。（國立臺灣大學畜牧獸醫系陳立治）

窩家有現灣臺

雙萬百九共約

業情況怎樣？

②這幾年來雞蛋價格的波動如何？（高雄

家畜醫藥

問：①本省的養雞業情況怎樣？

②這幾年來雞蛋價格的波動如何？（高雄

公牛角門弄光頭毛

若要治療須先防門

問：我家有一頭公牛，由於牠好角力的關係，把頭上的毛差不多都弄光了，到現在約有三年多，一直沒生過，所以難看得很。有人是不願意有這種牛。請問怎樣才能使牠頭上的毛重生呢？聽說現在有一種藥抹上去，就能生毛，有這回事麼？（高雄縣美濃鎮鍾得源）

答：你首先要防止這頭牛不再角鬥，因為脫毛部位如有傷口，痊癒後就不容易生毛。

治療可用皮膚刺激藥，如芫青面一分，酒精五分混合，塗擦脫毛部位，略可促進發毛。（任善榮）

產下仔兔有盲目

可能缺乏維他命

問：我家飼有母兔一隻，每次生產小免，必定有一兩隻盲目的。如果換用別種系統的公兔交配，就沒有這種現象。請問這是什麼原因？（北港糖廠吳雄）

答：仔兔盲目的原因，大致有二：（一）缺少維他命A（二）異物傷害（隻眼失明現象）。至於盲目的遺傳現象，目前還沒有見到那一種動物有這種先例。來信並沒有把育目的詳情說明，所以無法肯定答覆你。（國立臺灣大學畜牧獸醫系陳立治）

窩家有現灣臺

雙萬百九共約

業情況怎樣？

②這幾年來雞蛋價格的波動如何？（高雄

家畜醫藥

問：①本省的養雞業情況怎樣？

②這幾年來雞蛋價格的波動如何？（高雄