

病蟲害

實蠅生活史圖，並不是蜂類。防治果實蠅的方法，你採用消極有效的套袋方法，則弊已如你所說。現在不妨試用砒酸鉛(三百倍或四百倍)加入赤糖液中，撒布在可能將要被害的將熟未熟的荔枝枝葉上，以誘殺果實蠅。如用碳酸銅粉代砒酸鉛也可以。或者用矽砂酸鈉(一百三十倍)在十六倍的白糖液中，每株果樹撒滴三百公份也可以。但最要緊的還是要注意根本的防治方法，就是實行單純種果樹栽培，切不可將枇杷、荔枝、番石榴種在同一地區內。又清除被害果，也非常重要。(省農業試驗所陶家駒)

養蜂

蜜蜂不喜不吉人乃是胡說迷信談。蜂箱處處有活請日便。

畜牧

耕牛汗腺發達少雖是盛夏不流汗。鬮刺挖肥田水。多施烏肥能防治。

家畜

雞瘟等預防注射須注意適當用法。造所可購。如要防除偽蟲可用BHC粉。

病蟲害

問：敵地所產的荔枝和此地在結實時期常遭受害蜂類為害，結果果實受影響。為了防止蜂害，用廢紙包套在果外，這樣固然可以防。

園藝

治降害，但是這樣却使荔枝在沒有成熟的時候容易脫落，此在套袋後容易腐蛀，如此損失又不小。請問究竟有沒有更好的防治方法？(彰化縣員林鎮農會)

答：根據你所說的荔枝批肥兩種果實害蟲是果實蠅(請參閱本刊四卷一期十八頁的果實蠅生活史圖)，並不是蜂類。防治果實蠅的方法，你採用消極有效的套袋方法，則弊已如你所說。現在不妨試用砒酸鉛(三百倍或四百倍)加入赤糖液中，撒布在可能將要被害的將熟未熟的荔枝枝葉上，以誘殺果實蠅。如用碳酸銅粉代砒酸鉛也可以。或者用矽砂酸鈉(一百三十倍)在十六倍的白糖液中，每株果樹撒滴三百公份也可以。但最要緊的還是要注意根本的防治方法，就是實行單純種果樹栽培，切不可將枇杷、荔枝、番石榴種在同一地區內。又清除被害果，也非常重要。(省農業試驗所陶家駒)

實蠅生活史圖，並不是蜂類。防治果實蠅的方法，你採用消極有效的套袋方法，則弊已如你所說。現在不妨試用砒酸鉛(三百倍或四百倍)加入赤糖液中，撒布在可能將要被害的將熟未熟的荔枝枝葉上，以誘殺果實蠅。如用碳酸銅粉代砒酸鉛也可以。或者用矽砂酸鈉(一百三十倍)在十六倍的白糖液中，每株果樹撒滴三百公份也可以。但最要緊的還是要注意根本的防治方法，就是實行單純種果樹栽培，切不可將枇杷、荔枝、番石榴種在同一地區內。又清除被害果，也非常重要。(省農業試驗所陶家駒)

多施烏肥能防治

問：水田裡有許多蚯蚓挖穴，以致水份流失不能保持，請問有什麼方法可以殺滅蚯蚓？(苗栗縣通霄鎮蔡青泰)

答：殺死蚯蚓，保持水分最經濟的方法，是使用是氫氮化鈣，須在水稻種植以前施用，施法與通常相同。但施用需用比通常多幾倍，每公頃須施用一千四百公斤。至於應用其他藥劑也可以，但太不經濟。(陶家駒)

防治介殼蟲可噴夏油劑


兩月蟲再生不妨重新噴。問：噴撒夏油劑，對於殺滅各種介殼蟲有很好的效果。大概是因為天氣熱的關係，施用後不到兩個月，漸漸地又有看到發生的，是不是可以再用夏油劑噴撒？

答：噴撒夏油劑後不到一個月，可否用魚藤精乳劑來殺滅介殼蟲？(嘉義縣竹崎鄉鄭鴻鏞)

答：使用夏油劑後，如果不到兩個月，又有介殼蟲漸漸增多，可等雨季過後，果實長大的時候，再噴一次。

問：我種的蔬菜被菜心蟲食害，損失很大。尤其是花椰菜、甘藍、小白菜，和芥菜受害最重。現在附上害蟲標本。請問這蟲學名叫什麼？怎樣防治？(嘉義縣朴子鎮林義雄)

答：你寄來的害蟲是菜心螟(見圖)。菜心螟的學名是Oebia undalis Fabricius，你可用DDT乳劑加水五倍噴撒防治。對於花椰菜、甘藍、小白菜、芥菜等在播種發芽後，真葉生出土三、四葉時起，每七至十天撒布一次，這樣連續幾次，便能有效撲滅。花椰菜、甘藍、芥菜不論在苗床，或移植後，必須連續撒布。花椰菜將開花後，必須停止撒布；甘藍在結球後，仍須繼續撒布。小白菜在收穫前二星期，必須停止撒布。



菜心螟

芥菜到收穫前三星期須停止撒布

最好凡是你們附近種菜的農友們，大家一致起來共同防除，直到完全不發現菜心螟幼蟲的時候，才停止用藥。這樣比較經濟而有效，對於蔬菜的食用也更為安全。DDT乳劑可向高雄市成功二路四號農業化工廠購買，請參閱本刊上期十二頁的廣告。各地農會也有代售，價格每公升二十元左右。(陶家駒)

本省橘樹適宜種類

問：栽種橘樹適宜的氣候和土質怎樣？種類要怎樣選擇？(新竹縣橫山鄉龍德海)

答：在臺灣種橘樹，氣候方面除高山地區外，是到處可種的；但防颱風要作防風林。土壤以微酸性最適宜。本省中部、北部和東部可種甜橙、晚密夏、柳橙、桶柑、椪柑、檸檬、葡萄柚等；在南部可種文旦、白柚、葡萄柚等。(臺灣大學園藝學系胡昌熾)

柑橘園培土僅適於幼樹

問：柑橘樹年年培土，果積至一公尺多厚，請問這對於柑橘樹的生長有沒有影響？(龍德海)

答：柑橘樹培土在初開始是有利的，因為能使排水良好，保護根部，和增加土壤肥力。但是積土經數年高至三、四尺，果樹根部被土覆蓋更深，勢必缺乏氧氣而發育不良，容易發生落葉落果，甚至全株枯死。又如如果樹幹部纏有泥土，發育不會良好。又容易傳染病蟲害，所以培土只能在幼樹期間施行，大樹以不培土較妥。(胡昌熾)

番茄臺中三號品種

問：「臺中三號」番茄的果形，果色，品質等怎樣？種子何處有售？

答：「臺中三號」是否適於南部栽培？

問：「臺中三號」果形屬於中小至中等大，果型扁圓齊一，紅色，品質良好，在不良環境下結果率較高，是市場用品種(非加工用)。本品種為臺中區農林改良場推廣的品種，如需少量純種試作，可函臺中市向上路該場接洽。

②臺灣南部蔬菜市場和青果市場最歡迎的番茄果形條件如下：①果形中大(一果重約二五〇公分左右)；②果型深厚，或近似球型；③外表光滑豐正。所以「臺中三號」不適合於南部市場。

③本省南部地區在平地到現在，還沒有任何品種可以在夏秋季(指四、七月播種，七月、十月收穫。)水田或旱地經濟栽培成功的。(郁宗雄)



，但各處價格很不一致。就近洽讓也許比較便宜。(省農業試驗所林珪瑞)

養蜂
問：據說蜜蜂不喜歡親近不吉之人(帶孝人或產婦)；否則，蜜蜂就會遠遠逃走了，這是否事實？(花蓮縣吉安鄉蕭家發)

答：你所說蜜蜂不喜歡親近不吉之人，這是毫無科學根據的迷信，切不可信。飼養蜜蜂如果管理很得法，蜂羣只有漸漸旺盛，決不會遠遠逃走的。(請參閱本刊四卷三期「怎樣養蜂」)

蜂種處處有

治購請自便
問：①請問蜜蜂何處有售？(花蓮縣吉安鄉蕭家發)
②意大利黃金蜂種何處有售？(高雄市陳紹平)

答：①本省北、中部的主要養蜂場有下列各處：
一、臺北縣蘆州鄉保佑村蔡長庚等有蜂羣約二百羣，副業養蜂。
二、臺中市三民路四十一號施學真專業養蜂，有蜂約一百五十羣。
三、鹿港鎮錦仔有蜂一百五六十羣，專業養蜂。
四、嘉義市中正路二百二十四號董再發，及二百六十二號毛反，各有蜂約數十羣，都是副業養蜂。

在嘉義市中正路還有幾家養蜂的，臺中霧峰也有養蜂的。

耕牛

問：耕牛在夏天耕犁的時候，張口結舌，熱不可耐，何以不會流汗？這是什麼原因？(嘉義縣六脚鄉李榮澤)

答：夏天氣溫高的時候，牛的身體表面和呼吸器官的熱散作用受到抑制；而且水牛皮很厚，汗腺不活躍，所以通常不見發汗。因為呼吸器官熱的散增加，所以呼吸次數也有顯著的增加，牠是必需極端努力呼吸來蒸發水份，這樣才能調節牠的體溫。(恒春畜產試驗所任善榮)

閩割能傳染豬瘟

問：聽說離仔豬去勢的時候，可能傳染豬瘟，一般人似乎還不太關心注意。請問這是否事實？如果去勢是能傳染豬瘟，這樣對增產極有妨害。希望當局研究妥善的辦法以保特養畜的安全，增進社會福利。(彰化縣芬園鄉王清俊)

答：關於離仔豬去勢(卵巢剷除)，因為去勢業者(閩割人)來往各地閩割，如果接近有病地區，當然會帶病毒到各地，而使豬瘟流行。所以在豬瘟流行的時候，這些去勢業者以及豬商不應隨便進出疫區。而平時如要閩割，也必須把所有的手術器具消毒以後才能閩割。消毒可以用百分之來蘇肥皂水將器材浸漬十分鐘以上。(農復會畜牧生產組)

選免家兔挖穴逃

應使生活安且適
問：豐年三卷二十二期的「怎樣養兔」我看了很有心得，但還有幾個問題要請教。
①為了防止家兔逃跑，四週圍得很好；但當中是土地，牠是否會挖洞逃走呢？
②一坪可容大兔十隻，一坪等於多少平方公尺？(樹林鎮馬松柏)

答：①家兔的運動場和房舍地面，如果是泥土或疏鬆的砂石，即便有竹木之類的圍籬或板壁，家兔仍然可能從籬邊或牆基挖洞逃跑。所以務必在圍籬板壁處的泥土中築砌三尺深左右的石塊，或深埋竹木。同時要密切注意兔的生活情況，使牠生活安適，這樣才不致發生逃跑。
②家兔所需兔舍地面積的大小，應該按兔種的大小來決定，因為大型種的兔，成年體重有二〇磅左右，自然每兔所

佔面積較大。一坪等於三·三平方公尺，就臺灣現有的兔種，容納十隻成年兔是合乎標準的。(臺灣大學畜牧獸醫學系陳立治)

肉用兔體肥大

毛用兔毛豐盛
問：肉用兔和毛用兔的特點各怎樣？又臺北什麼地方有種兔場？(馬松柏)

答：肉用兔的特點是：體軀肥大，頭足較小，性情溫順，成熟早，成兔體重平均有四、五公斤左右，如紐西蘭白兔(ニュージーランド)。毛用兔的特點是：毛豐滿細長，潔白而有光，有彈性，如安哥拉兔(アンゴラ)。

本省沒有毛用兔的飼養。肉用兔種在士林鎮社子葫蘆里十七號郭丁發君處有售。(陳立治)
(按：農復會森林組夏之驊先生處亦可函洽大型兔種)

雞瘟預防注射

須注意
問：注射雞瘟疫苗，一次的用量是多少？幼雞的用量又是多少？注射的部位是何處？注射後經過多久須再注射？其他還要注意些什麼？(員林鎮吳火烈)

答：打預防針時成雞每次血清量二至三立方公分，雞

一至一·五立方公分；血清量成雞每次一至一·五立方公分，雛雞〇·五至一·五立方公分。一般的預防期有三至六個月。注射量及預防期的詳細情形請看藥品出品廠商的說明書。注射部位在胸下龍骨邊的皮肤下。血清可用為預防或治療用。疫苗只能應用預防用而不能當治療用(即已有病的雞隻不宜應用)。(省農業試驗所李登元)

雞瘟預防疫苗

獸疫血清製造所可購
問：雞瘟、雞痘對養雞的損失是極嚴重的，假使要施行預防注射，注射藥向何處可以函購？一瓶有多少立方公分？價錢多少？(吳火烈)

答：雞瘟、雞痘疫苗可向臺北縣淡水鎮農林廳獸疫血清製造所函購，每瓶容量有十立方公分和五十立方公分的。一般農民都可去洽購，價格和手續等情請函該所查詢。(李登元)

如何防治鴿瘟

可用BHC粉
問：鴿子身體上羽毛中有許多鴿瘟，請問有什麼防治方法？(嘉義縣大林鎮張長鴻)

答：鴿子身體上的鴿子，可向西藥房購買BHC殺蟲粉，撒在鴿的羽毛內，再用手揉擦，這樣就能殺死鴿子了。(省農業試驗所李登元)

