

談驗經

『怎樣栽培萑菜』

高雄路竹鄉甲南村 畦間

一、萑菜的種類

萑菜的種類有尖葉種和潤葉種：

- ①潤葉種全株刺起以供食用(比較開花稍少而兩期中不可割食)
- ②尖葉種花蕊供為食用，兩期中出產很盛。

二、播種

大概採收到農曆八月中旬(白露前)以後，隨時能開花，但是質也劣，量也減少，所以留為做後來的種子。種子是黑色，扁三角形。採取後晒四、五天，貯藏瓶內把瓶口密封。

播種：最先苗床的土，用鋤掘鬆，用堆肥做基肥(數量依據苗床土質而定)然後再用鋤打碎土粒。把堆肥和土均勻混合。四圍作畦(灌溉時不流苗床外的程度)然後把種子散播於苗床，並用手輕輕掘之，使種子混入土中，上面覆以蘆草，灌水(用人擔的灌水桶)到全部濕的程度就可以，當初每天要灌水一次。未發芽時，只怕螞蟻的侵害，所以播種時，周圍要用生石灰或者DDT粉散噴。發芽後要五、七日，發芽後經過三、四日所覆的禾草要全部除棄，否則所種的苗，會「徒長」日後致有弱苗。此後要看氣候的情形，若繼續旱天，要二、三天灌水一次。幼苗極怕旱天，若無每二、三天灌水，葉會呈黃色而枯死。苗期絕不可施

三、本田的選擇和整地

整地

- ①選擇：須要砂質土灌溉便利，排水暢流，逢久雨也不滯水，少混粘土質。
- ②整地：用犁犁三次，以後用鐵耙耙平，使灌溉與排水便利暢通為原則。

四、栽植與管理

- ①栽植：條植株間八寸為適當。各株有五、七支萑菜根，施肥不可過深，栽植期間最好利用早期。
- ②管理：幼苗移植本田以後，若畑地過旱的時候，從移植的株距二、三寸的地方，使用半型鋤作溝，深約二寸，使水量少而能够直接浸根，三、四次就可以。最好用犁犁兩溝，深五寸，施用堆肥。
- ③中耕除草：雜草容易發育，每逢草便除，中耕時時施行，除草與中耕不論回數。
- ④注意：管理最重要之事，兩期中(收穫最盛期)絕對不可中耕，若中耕會使全面土質很鬆，雨水含得很多，使菜根腐敗，全株變黃色而死。

經濟部農業化工廠

六角牌 農藥大減價

本廠為協助農業增產服務農友 特將各種農藥減價批售如下：

- 10% DDT粉—每噸4,000元 (原價5,500元)
- 25% DDT乳劑—每桶(200公升)4,000元 (原價6,000元)
- 5% DDT粉—每噸2,900元 (原價3,800元)
- 15% r-BHC粉—每噸3,400元 (原價4,000元)
- 1% r-BHC粉—每噸2,550元 (原價3,000元)

以上農藥請各農友向各農會零星登記 集中購買，粉劑最少在一噸以上，乳劑在二百公升以上，即可取得上列減價優待

其他家庭用，蔬菜用，菓樹用殺蟲劑種類繁多 說明書價目表函索即寄

歡迎代銷 利潤優厚

廠址：高雄市成功二路四號 臺北通訊處：臺北市南陽街卅六號

永豐的 農業用玻璃布

於草苗圃 必須保護


購用

玻璃布，

支出少，

收益多。

其他栽培高級 蔬菜，果實， 花卉時，使用 農業玻璃布可 使生育良好。



永豐化學工業股份有限公司

臺北市延平南路五十九號