農家月曆 豐年雜誌

民國三十四年 十一月份

水稻

北部：（臺北、新竹區）蓬萊種中晚熟種本月上旬收穫，在來種本月下旬收穫完畢。收穫後稻谷日晒五、六天，充分乾燥，以風車淨選，除去夾雜物，貯藏。收穫後及早耕犂翻土。

東部：（花蓮、臺東區）花蓮區上旬二期作收穫完畢；臺東區蓬萊種上、中旬收穫完畢；在來種下旬收穫完畢。臺東區早中熟收穫後，立即整地，播種小麥。

中南部：至中旬全部收成完竣。收成時低刈，裏作田稻株自地下一—二臺寸部位鋤起，以防止螟蟲發生。

甘藷

大冬甘藷：莖葉過於繁茂的，多行一次翻藤。

糊仔甘藷：扦插後三〇天左右，第二次培土。經驗土壤入壤中，適量灌溉。可過多。如土地過乾時，即時搬開稻藁，從速施下半量肥料，如有腐熟土糞蓋上更好。

②播種後十—十五天（蓬萊稻）要掘起稻株，放在播條傍邊。然後以蜈蚣犂就各條行間犂起，以便追肥後即時培土。

③每公頃肥料總用量：硫酸銨三〇〇—四〇〇公斤，過磷酸鈣二五〇—三〇〇公斤，氯化鉀一〇〇—一五〇公斤。基肥和追肥各用一半。追肥必須在播種後二十天以內，霧水散開後施用。

④灌溉：除糊仔外，播種後即時灌溉。

⑤追肥後注意除草，雜草幼小時除却較易。「2，4—D」殺草藥「可在播種後第三十天施用一次，或第二十及第四十天使用二次，每分地用藥量五〇公分，用水稀釋一、八〇〇倍，噴佈播條兩傍。

⑥追肥後即時培土。

小麥

①糊仔：即時搬開稻藁，從速施下半量肥料。

②播種後十—十五天（蓬萊稻）要掘起稻株，放在播條傍邊。然後以蜈蚣犂就各條行間犂起，以便追肥後即時培土。

③每公頃肥料總用量：硫酸銨三〇〇—四〇〇公斤，過磷酸鈣二五〇—三〇〇公斤，氯化鉀一〇〇—一五〇公斤。基肥和追肥各用一半。追肥必須在播種後二十天以內，霧水散開後施用。

④灌溉：除糊仔外，播種後即時灌溉。

⑤追肥後注意除草，雜草幼小時除却較易。「2，4—D」殺草藥「可在播種後第三十天施用一次，或第二十及第四十天使用二次，每分地用藥量五〇公分，用水稀釋一、八〇〇倍，噴佈播條兩傍。

⑥追肥後即時培土。

甘藷

四三—四四年期：

甘藷：

①防治鼠害，盜食。

②選定鍾度（步留）高的蔗園，先行收穫。

③不留宿根的蔗園，收穫時把「葫蘆頭」整個掘起。預定留宿根的頂多留十公分（三臺寸）的「葫蘆頭」（蔗頭）。

四四—四五年期：

①各地區一律舉行中耕、除草、灌溉。

②九、十月種的施第一次追肥。

③二期糊仔及沿天田糊仔甘蔗，並施第一次追肥。

④生長良好的蔗園（少缺株無嚴重病蟲害的），才可以留宿根。收穫後數日內，即需開始清理蔗園，進行宿根作業：㈠削平蔗頭（用鋒利的鋤頭或曳引機）㈡兩側開根（用牛犂或曳引機）從蔗行中線起，兩旁各留一五—二〇公分（五—七臺寸）㈢株間排土，㈣施肥，㈤施BHC殺蟲㈥行間株間中耕，㈦用蔗頭分株補植，㈧充分灌溉。

棉花

①六月播種的，纖維分別採收好壞，行採收籽棉，分別好壞。

②西部濱海地區和東部播種較早的棉田，即可種後作物。

③晒乾後貯藏或調製。

④颱風暴雨前，應趕快搶收。大棉鈴可彈製被絮。

⑤清理翻耕，即可種後作物。

苧麻

（一）吸枝繁殖的，畦畔除草，清理水溝，乾旱時應灌溉：①臺中新竹和花蓮地區山地，預定明春新種區。②新竹、臺南、臺東三水收穫後，中耕除草，施用追肥後培土。③高雄新裝區，整地施基肥定植，老廠園四水收穫後，中耕除草培土。

（二）實生苗繁殖的，南部繼續本田定植，北部苗床假植。

黃麻

①留株採種的淺留麻莖，剝製粗麻或靠洗麻後，應在規定採種麻收穫後，留麻莖，剝製粗麻或靠洗麻後，應在規定採種麻收穫後，止期前，脫粒晒，運農會繳售。②汗挿採種的，密閉貯藏。③各地浸漚池，換灌清水，可利用飼養吳郭魚。（本年黃麻工作結束，到明年二月以後，才有作業）

落花生

第二期秋作七月間播種較早的，開始收穫，作燃料。應司充飼料，製造堆肥或晒乾燒灰。②發芽後兩個月的，停止中耕，除雜草培土。注意不要鋤動株旁泥土。③發芽後三個月的，拔除病死株燒灰。除高大雜草，拔除病株燒灰。

茶樹

北部：①冬茶收量少，品質欠佳，最好不要採摘，不但影響發育並促進衰老。

②發育正常的，可行淺剪枝（五、六公分左右）。

③二期糊仔及沿天田糊仔甘蔗，並施第一次追肥。

④生長良好的蔗園（少缺株無嚴重病蟲害的），才可以留宿根。收穫後數日內，即需開始清理蔗園，進行宿根作業：㈠削平蔗頭（用鋒利的鋤頭或曳引機）㈡兩側開根（用牛犂或曳引機）從蔗行中線起，兩旁各留一五—二〇公分（五—七臺寸）㈢株間排土，㈣施肥，㈤施BHC殺蟲㈥行間株間中耕，㈦用蔗頭分株補植，㈧充分灌溉。

茶樹

①六月播種的，纖維分別採收好壞，行採收籽棉，分別好壞。

②西部濱海地區和東部播種較早的棉田，即可種後作物。

③晒乾後貯藏或調製。

④颱風暴雨前，應趕快搶收。大棉鈴可彈製被絮。

⑤清理翻耕，即可種後作物