



**水稻害蟲不一
侵害其他作物**

問：①第二期作蓬萊稻受了蟲害，對後植物如番仔豆、甘藷會不會有影響？②蓬萊稻頭幼蟲，在深耕風化後，何時才會完全死掉？用什麼藥治療？（雲林水林鄉黃昭顯）

答：①水稻害蟲並不會侵害豆類、甘藷等其他作物，所以不同作物連作可以使蟲害減少。若同樣作物連作，就須注意防治，以免後作再被蟲害。

②水稻收割後十天左右，在稻頭部份，尚留下不少的三化螟幼蟲，廿到三十天後漸都化成蛹再變成蛾飛出去。到收割三十天後，留在稻頭的幼蟲已很少。深耕時若不澈底把稻頭翻入土中，幼蟲還會變蛾飛走的。所以最好在收穫時行低割，同時馬上灌水，把存在稻頭的幼蟲先淹死然後再深耕。（高雄區水林改良場洪元平）

問：水稻收穫後，氮化鈣（即石灰空素），如果於無風日撒施氣，效果

施肥法

答：每十公頃播種量約兩公斤許，出芽成長後，第一年因根瘤菌少，可略施人糞尿為追肥。到第二年春暖插秧整地時犁入土中，不過因耕犁前種子還沒成熟，所以須另設種子區留種，所需種子，可向省農試所洽商。

適當的兔舍

問：①我想做一個理想的兔舍，應怎樣設計？②欲促母兔泌乳，須怎樣飼育？（大村林誠華）

答：①我想做一個理想的兔舍，應怎樣設計？②欲促母兔泌乳，須怎樣飼育？（大村林誠華）

問：銀浮萍、糠飯、或大雞飼料和清水，但每次食量都很少。到該生蛋的時期了也不生蛋，別人說是太肥了，所以最近半月來就只銀白米飯，又造成食慾不振。要如何處理是好？（臺南市陳尚文）

答：①來享鶏採食性大，或因爲場所太狹，運動不足。

不立即耕犁，肥分是否會受太陽或其他作用而損失？（桃園邱金全）

答：氯化鈣作基肥，應在播秧前一十二星期施于土面，然後犁耕耙平，與一般水田整地方法同，使肥料和土壤充分混合，同時氯化鈣的毒性物質，也可在此期間經過相當的變化，而成爲無害有效態的。



母豬沒有食慾怎麼辦？

白質和灰分甚為需要。現列舉一配合例如下，以供參考。

大豆粕 二十% 花生粕 二% 魚粉 五% 細皮 一% 玉米 五% 甘藷籜 三% 骨粉 一%

米糠 二十% 二% 二十% 二十% 二十%

米糠 玉米 甘藷籜 食鹽 骨粉 魚粉 細皮

影響產卵能力，蛋白質量配合，單餵糠飯，易使發生過肥，不能或飼料風味不佳，也會影響食慾。



③除給與混合飼料之外，

每日每隻應給以三、四十克的青菜，飲水不可缺少。

④飼料中加入少許蕃椒，或胡椒，以刺殺鶏的胃口，可促進牠的食慾。

⑤現在正是換羽時期，鶏要停止產卵。你的鶏也是換羽，當給牠合理的配合飼料，使牠換羽快完了，就開始產卵。

⑥院子裡可放一淺箱，內裝細砂，使牠們砂浴（鷄沐浴不用水，而用砂），或擴大場所，或在院子裡撒少量粒餌（如小麥碎米），使牠們覓食，給以運動的機會。（鄭謙平）



來享鶏為何不生蛋

問：我在小院裡養了數隻來享鶏，至今已五個多月

了，前些日子每日

來就只銀白米飯，又造成食慾不振。要如何處理是好？（臺北市陳尚文）

答：①來享鶏採食性大，或因爲場所太狹，運動不足。

讀者服務

①農友王村棋（苗栗卓蘭鄉內灣八八號）現有向日葵種子一百餘臺斤。
②農友莊振祥（臺南後壁鄉嘉民村一〇一號）現有向日葵種子約七〇公斤。

如有需求者，請速與上一農友直接洽商。