

一月份 一隻羊家農曆



月十一—南部：①播種：臺中地區自一月在來種尚可於二月五日—十日播種。我種
餌精選的谷種，每公頃需五十公斤。
②播種後蓋以鋪好的細火燒土或草木
灰。秧田水品時常灌水，撒播前十天
除掉水，育生優良的須在插秧前一
秧田播佈兩次，種的B.H.，檢出蟲卵。
秧田插秧前一月，翻犁一次，至插秧前五
插秧前一月，再灌水，以全層施肥整地。
插秧後一月，高、雄區一月五日—十日，臺
南區一月二十日—二月五日。⑦肥料：
每公頃堆肥一百公噸，硫酸銨五百公
斤，過磷酸石灰二百公斤，氯化鉀五百公
斤，磷酸銨一百公斤，做追肥。⑧插秧：應用
正條幅植法。⑨除草：第一次除草，在
插秧後十二—十四天行之。第一次除草在
星期前，本田再耕犁一次，秧田在下種前
田整地法（本月上旬）。苗床，浸水，照一般
種期在本月底下旬。浸種前先復土，每公
頃播入水一千克，分之。第一—三—四—五—
後洗淨浸水三晝夜。浸漬一小時，分之。
放入木桶催芽。第一—三—四—五—六—七—
旬，北部（臺北新竹區）：本月中上旬
在來種尚可於二月五日—十日播種。我種
餌精選的谷種，每公頃需五十公斤。
②播種後蓋以鋪好的細火燒土或草木
灰。秧田水品時常灌水，撒播前十天
除掉水，育生優良的須在插秧前一
秧田播佈兩次，種的B.H.，檢出蟲卵。
秧田插秧前一月，翻犁一次，至插秧前五
插秧前一月，再灌水，以全層施肥整地。
插秧後一月，高、雄區一月五日—十日，臺
南區一月二十日—二月五日。⑦肥料：
每公頃堆肥一百公噸，硫酸銨五百公
斤，過磷酸石灰二百公斤，氯化鉀五百公
斤，磷酸銨一百公斤，做追肥。⑧插秧：應用
正條幅植法。⑨除草：第一次除草，在
插秧後十二—十四天行之。第一次除草在
星期前，本田再耕犁一次，秧田在下種前
田整地法（本月上旬）。苗床，浸水，照一般
種期在本月底下旬。浸種前先復土，每公
頃播入水一千克，分之。第一—三—四—五—
後洗淨浸水三晝夜。浸漬一小時，分之。
放入木桶催芽。第一—三—四—五—六—七—

卷之三

①去年第二期秋作遲播的，可收穫完畢。②本年準備旱播地區，選上期未種落花生的地，翻耕整理，準備第一期春作播種之用。③東部地區

拾遺集

(一) 吸枝繁殖：①草上，年栽種的
新麻園，臺北區第一次移植，竹崎區
第三次中耕除草培土，翌年一水收穫
後施肥。②栽種二年以上，新竹三水
收穫，臺北臺中四水，高達五水收竹
後，中耕除草，施肥追培土。③新竹
南整地，施肥，開始定植。④臺
南臺東地，新種區整地，開溝作畦
(二) 實生苗繁殖：苗床或本田
定植於本田。

①本月採收的菸葉，採收日期可
延長十天左右。
②產葉在中葉以上的品質也不太
壞，不必除葉。

卷之三

①北部茶樹定植及補植應在本
月開始。②衰老茶樹本月仍可壅刈。

○中南部：①深耕：普遍施行深耕
備苗圃。④新聞茶園工作：建立水溝
階段道路。○⑤迴效性肥料：本月中下旬
施用。

大冬甘藷：酌量插秧時節，前廿天應全部收成，犁耕後風潤仔甘藷：過乾時需澆溉。

青飼料不足，命缺乏症。舍要保持乾燥溫暖，並驅蟲以保健康。本年夏飼育的仔從速肥育供應市場。

產卵期母雞宜給足蛋白質的飼料，促進產卵。人工育雛，注意保持適溫。育雛器應當保持乾燥，定期開窗換氣，保持溫度。北部氣候寒冷，飼養舍要保持溫暖，請保溫。冬季每日需給雞適當運動，朝夕寒時不宜外出，以免感冒。