




(文) 且 旦 暢銷全省

麻豆文

且暢銷全省各地，是本場省的大眾果物，也是極有發展前途的一種果樹。可惜栽培技術還是固

守舊法，不知改進，致使產量和品質日漸低劣，實在是柑桔類生產中的損失。現在提出栽培技術上急需改進的幾點，供給栽培麻豆文且農友們的參考。

一、選用優良母樹：從現有的結果樹中，選出品質優良產量較高的樹株，作為繁殖苗木的母樹，這是改良品質和增進生產的基本工作。

二、應用嫁接法：麻豆地方的文且繁殖法，習慣採用壓條法（過枝或トリキ）。這種繁殖法，雖能保持母樹的特性，但不能用於大量繁殖，且將來的苗木生育不旺（因柚類用壓條法繁殖時，所發的不定根不甚發達）。今後應改用嫁接法，以柚類的實生苗作為砧木，從優良母樹上剪取接穗，將來的苗木，結果一定優良。

三、更新和補植：今日麻豆等地的文且結果樹，樹齡均在四十年以上，生長衰弱，枝葉稀疏，產量日減，品質低劣。應該從速更新。又果園的缺株普遍很多，應該趕快補植，以增加收益。

栽培麻豆文且應改進的幾點

劉介希

四、增用磷鉀肥料：麻豆地方種植文且的農友，施用的肥料，多為自製的堆肥。堆肥雖然含有多量的氮素，但磷、鉀含量極少，今後宜混施磷、鉀肥料，以增強樹株的生育，增進果實的品質。至於施用量，要看單位果園的缺肥程度和樹齡大小而定。據士林園藝試驗所過去所用標準，十年生的柑桔，每株肥料施用量為氮一八七·五〇公分，磷二四三·七五公分，鉀二六二·五〇公分。但柚類樹株高大，生長旺盛，需肥量為多，或可加倍施用，以增強樹株的生育，增進果實的品質。

剷防治。潰瘍病可在四月六月間，各撒佈波爾多液一次，即可防除。至於天牛，在目前只有勤於捕殺。六、種植防風林：颱風為本省的天災災害，人力難於抗拒，但在果園周圍種植防風林，可減少受害程度。麻豆等地的柑桔園防風林，以種植刺竹為佳，因其叢生而生長高大，最有防風的效果。七、栽培技術指導：農業試驗機關，應在文且主要出產地區，設立栽培技術指導站，介紹栽培知識和技術，經常的指導農友，一定能收事半功倍的效果。

五、防治病蟲害：

現在出產的文且果實，果形小而果面污穢皺縮，樹株生育衰弱，這些都是受病害的影響。文且主要的病害是煤病、象皮病，和潰瘍病，主要的蟲害為介殼蟲類和天牛。介殼蟲類是煤病的誘因，只要把介殼蟲驅除，煤病自然減少。每年五、六月間撒佈松脂合劑及夏油乳劑即可驅除介殼蟲。又樹株上的蟻巢，也要驅除，因為蟻巢會保護介殼蟲。可以用BHC的粉末，撒入蟻穴內驅除

專 營 !!

- 一、各種國內外優良蔬菜種子。
- 二、各種農業用殺蟲、殺菌劑。
- 三、各種園藝用農具及噴霧器、撒粉器。
- 四、各種增產除草用植物荷爾蒙。

滅蟲聖藥「滅蟲靈」粉劑

效力強大 價格低廉

● 捕鳥用「カスミ網」

● 西洋松茸菌絲

商品目錄西洋松茸栽培法

「附郵票肆角」函索即寄

全省唯一專營農業生產資材貿易商

臺北市迪化街一段二五六號

臺灣劃撥：1953號 電話：44253號

臺灣農產企業公司

董事長 廖學義 董事 農學

。象皮病由於一種壁蝨的寄生，應在每年四、五月間撒佈石灰硫黃合