亞麻的栽培和收穫

（續上期）

劉鴻德



（圖八第）

九、堆積

堆積的目的在使原莖蔭黃變枇杷色，以提高品質。宜擇比較高的乾燥地，每隔二公尺，並立長二公尺的竹竿兩枝。兩枝竹竿中間的寬度約四十五—六十公分，再用短竹竿橫搭捆紮，並將長竹竿二支縱搭捆紮，作爲基臺（第七圖下）。然後將原莖小束梢頭部向外交互堆積，高度以二公尺爲標準，頂面覆蓋草蓆如屋頂形（第七圖上）。堆積中應使原莖適度發熱，促成變色，並要時常檢查發熱程度。發熱過甚時，要立即將麻堆散開，通風冷却後再行堆積。大概經過三星期，原莖變成枇杷色時，即可打開。仍如上期第三圖曝晒，務要使原莖十分乾燥。

過去十三年間臺灣亞麻栽培面積及原莖生產數量表

年別	栽培面積（公頃）	原莖收量（公斤）	每公頃平均（公斤）
三七—三八	六四	二四一六三	一七八三
三八—三九	一〇五五	八一七九四	六〇
三九—四〇	一二四八	一三三六九三	一〇四二
四〇—四一	三八四二	三七六七四三	一三五
四一—四二	三二九七	四三九四九六	一三三
四二—四三	一〇九三三	九六一五六〇〇	八七九
四三—四四	一七六六六	六八九八二七五	九〇五
四四—四五	一四	八二四六	五八九
四五—四六	一三六	三四一五三	一六九七
四六—四七	六六八	一三四八六六	二〇九三
四七—四八	一〇一三	二三八九七四	二一九〇
四八—四九	四四四	八七四八	二四
四九—五〇	二一〇	三七六三	一七九八

十、調製

原莖乾燥後即行調製，先把種子部分用脫穀機脫粒，再用風鼓和篩除淨土砂、蒴殼、雜草種子和其他夾雜物，然後再行充分曝晒種子。

原莖打捆時，須選集品質相同的捆裝一起。根部向兩側，梢頭部交互向內排列整齊，用草繩捆紮三道（第八圖），每捆長約一公尺，淨重三十公斤。

十一、收量

本省普通栽培，每公頃原莖產量可達二、五〇〇公斤，原種可採得六百公斤。原莖的製纖率，正線十一%；粗線五%。茲摘錄過去十三年間臺灣亞麻栽培面積及原莖總生產數量表（在本頁左上角），以供參考。（完）



（圖七第）

水稻增收特效藥
土蘭師扶朗多旺
トランスプラントン
水稻增收每甲500～1500臺斤
每甲一矸只十八元
試作用（五分地）：十元
處理時期：插秧十日前後

臺北縣三重鎮農友秧田施用土蘭師扶朗多旺情形
☆ 各種說明書函索即寄，請附郵票4角 ☆
其他農藥：2.4—D「石原」蕃茄多旺等現貨供應
臺灣總代理店 大豐農藥行
臺北市寧夏路23號　郵政劃儲臺灣10620號
各地分銷處
臺北市衡陽街　農林廳農業加工實驗廠
臺北縣三重鎮　農興種子農藥行
臺中市第三市場內　農昌園藝商行
彰化縣埔心鄉瓦窰厝　信永園
彰化市中華路23號　梅春園
高雄縣鳳山鎮三民路231號　大同