

（上接廿四頁）「香菇客」

「喂，小牛哥，那你留幾棵樹給我好嗎？千萬別砍光了！」小黑炭，一面喘息一面仍緊隨不放。

「傻瓜，樹怎麼砍得光呢？不要跑了，快回去罷！」小牛向他揮揮手。

「好……喂，小黑炭！」小牛猛然回頭走離行列，緊張地大叫着：「記得不要砍得太深了，聽見了嗎？」

「聽見了，我知道了！」小黑炭遙應着。

「告訴阿寶那個小飯桶，叫他多用點力氣呀！」

「喂……」

「叫阿林不要砍得太密了！」小牛用盡氣力地喊着。

「知道了！小牛哥，你還不快點趕上去？他們已經走遠了！」

「啊……？」小牛急忙回身，提起簇新的棉襖袖口拭了一下厚大的嘴巴，顫動着行囊，展開如飛的脚步，勇敢地追到了行列的前面，歡欣鼓舞地和每個出發上山的香菇客完全一樣。（完）

柑園經驗談

姚啓松

① 柑橘樹每年最少要施肥兩次，尤其硫酸銨，每年至少要用兩次。第一次在春季時，柑樹正在發育生長時，及開花以前，第二次在柑果收剪完畢以後。硫酸銨是幫助柑樹的生長及果樹發育的好肥料，所以，苗木也可以每月施用硫酸銨一次，是很適宜的。

② 柑橘樹栽植的距離，不可太近（不可密植）。農友們常用的柑樹橫縱的距離，大凡均是六臺尺，這種栽植株距過於太近了，所以生產量低少。並且柑樹的發育也不良，這都是密植的後果。密植而且直接影響到柑樹的產量和樹株的壽命。適當的距離，如像柑相相隔的距離，至少要一丈至一丈二臺尺，柑柑至少要一丈三臺尺至一丈五臺尺。像這樣才是較為標準而適合的距離。

③ 柑園的排水設備要良好，平時要常常保持柑園的清濶。以及常要防治害蟲的發生。

④ 有的柑農們往往種植不良的柑苗，到了四五年以後方發現柑樹不結果實的現象。這都是剪下生長不良的母樹的芽條，嫁接繁殖苗木的結果。我們一定要從生長優良的母樹上，去選擇良好的芽條，來嫁接繁殖幼樹。

（山林農村園藝用） 新強力綜合殺蟲劑

多利農 TRINON

樣品備索付郵三元即送

徵地方推銷處條件從優

欲保田園無害蟲
必須常備「多利農」

業務處 台北市中正路一九九號
電話 二二二〇〇〇

廠址 台北市迪化街一段六十三號

益隆農化五廠
I-LUNG AGRICULTURAL & CHEMICAL FACTORY

國立臺灣大學
農學院教授

陳焜菘先生推薦

多利農

Trinon 是現代科學最進步之農藥，能同時一併殲滅田園所能發生之青蟲、龜神、夜盜蟲、鑽心蟲跳龜蟹由水肥傳來之傳染病菌等一切害蟲實屬山林農村界所熱求之綜合性滅蟲妙藥也（歡迎試用）