





卵蛔傳以料做可，豬化份有。糞流入
。蟲播免，肥用不糞的腐充沒坑入

(四) 開鑿糞坑

豬舍應常掃除，豬舍旁邊開鑿一個糞坑，用來貯藏糞尿。豬舍地面略向糞坑傾斜，豬糞尿可以沿溝流入。



。蟲蛔染感

(五) 母豬生產前後的清潔


母豬將生產時，應洗淨腹部和乳房。產後的哺乳期中，還要時常洗滌，以免仔豬從母豬體上感染蛔蟲。



(六) 兩種優良的驅蟲藥

中國獸醫藥廠出品之「畜蟲散」，亞東農畜藥品廠出品之「肥豬驅蟲藥」，都是驅除蛔蟲的有效藥品，服用後並無不良後果。

目前該兩工廠為了配合農復會和省農會推行的防豬蛔蟲計劃，大量生產，經由各地農會及農事小組，普遍供應農友，希望多用。



(七) 使用藥劑的方法


仔豬出生二個月至三個月之間，驅蟲一次。第一次驅蟲二個月至三個月後，再驅蟲一次。驅蟲時，需絕食，按說明書規定劑量混合飼料，在中午給食，濃份中給，早晚兩次，連續給完。

給完兩次，早晚兩次，連續給完。

治防樣怎 蟲蛔豬



- ①本省農友養的豬，八〇%都有蛔蟲寄生。
- ②有蛔蟲寄生的豬，生長緩慢，體重不足，嚴重時就會死亡。
- ③有蛔蟲寄生的豬，平均每頭增加飼料用量一四〇公斤，浪費一個半月的飼養時間。
- ④本省每年因蛔蟲寄生而損失的豬肉量，約值新臺幣一億三千一百餘萬元。



豬的健康 豬的生寄蟲蛔

(一) 感染豬蛔蟲的症狀
初期病況不很明顯，等蛔蟲長成且蟲數多時，漸漸疲乏萎頓，食慾不振，皮毛剛粗，皮膚乾燥，體瘦削，並可能發生頑固的下瀉，豬體長。

亡就重，病疽、肺難吸、昏血、腹、貧、死時嚴症等黃炎、困呼睡、貧痛。



。滾煮再，時小四十二置放後

(二) 消毒猪舍

熱鹼水或熱石灰水澆潑在猪舍地面和牆壁低處，既可殺死蛔蟲卵，也殺滅其他細菌。熱石灰水是普通生石灰加水混合，攪拌。



(三) 猪舍運動場更換泥土

猪舍要經常保持清潔，使日光充分晒入。猪舍運動場泥土，每月應鏟出表土四—六寸，換填清潔的沙土。每窩小豬遷入以前，

。換更意注要更，