



本社贈送的蔬菜種子栽培要點

郁宗雄 · 陳文郁 · 陳 嘆

二、甜 椒
(品種 · Ruby King)

本社為酬謝愛護本刊的讀者，凡響

應第二次徵求訂戶運動，代徵得一位訂

戶的，都贈送一份蔬菜種子。贈送的番

茄、甜椒和鳳山白菜菜種，都是鳳山熱


帶園藝試驗所採種的，種子優良可靠。

因為種子袋上的說明太簡單，所以請該

所的家，分別說明栽培要點。

一、鳳山白菜

(1) 特性 鳳山白菜是一種不包心的白菜，又名「白葉仔白菜」「黃葉仔白菜」。株形端正，葉色黃嫩可愛。葉柄白色，品質柔軟細嫩無苦味，適於炒食和煮湯，生性強健。耐熱不耐冷，所以只適於高溫季節栽培。尤其在夏季蔬菜缺少時，獨生長旺。




盛。種子比一般白菜細小。

北部從新曆四月中旬到九月，中南部從三月下旬到十一月中旬。如果更旱播或更晚播，因低溫關係，生育都不好，很早就會抽苔，所以一定要在適期內播種。

(3) 栽培方法 可以參照各地白菜的栽培方法。土質與砂質壤土，排水須良好，在夏季切忌低濕土地，不忌連栽。生育期間只有一個月左右，可以利用夏季水田做裡作栽培。以直播為原則，十公畝地種子用量約五百公分。播種用撒播，發芽後半個月內絡續勻拔劣苗，使各株約有十二公分見方的距離(距離越大株形發育也越大，生育期也越長)。鳳山白菜還可用移植栽培，利用黃床育苗，以縮短在本園的時間，但移植時很費工夫。播種至幼苗期如遇暴雨，仍有失敗的危險，須重行整地播種。栽培期間注意灌水，忌乾旱，夏季晴天應早晚各澆水一次。除草宜勤，趁幼小時用手拔去。肥料可單用人糞尿或硫酸銨作追肥。生育期如有菜心螟(食心蟲)和黃條葉蚤等為害時，應用DDT或BHC藥劑防治。如有蚜蟲發生，應用魚藤精乳劑防治。

(4) 收穫 生育至抽苔期前為收穫標準，直播的大約播種後經一個月，移植的在移植後經二十日，可達收穫標準。十公畝的收量約四千公斤。

(5) 採種 準備採種的播種適期，是九月至十一月中旬(北部八月至九月)。普通栽培的，抽苔開花後，也可以留種，但須避開當地白菜採種田，



(1) 特性 株形直立，粗壯強健。分枝性較弱，葉形闊大，早生，善於結果。果實碩大，充分長大時縱徑可達十二公分，橫徑可達八公分，重量達一百八十公分。果面微有波狀起伏，梗深凹。果肉稍薄，脆嫩多汁，無辣味，成熟時猩紅色。

(2) 播種適期 北部八月至十月，一月至三月，中南部八月至二月隨時可以播種，而以九月至十月播種最適。

(3) 栽培方法 用黃床育苗，苗距勻拔至八公分見方。育苗期間高溫期約四十日，低溫期約五十日，有五、六片葉時定植至本園。本園應選三、四年內沒有種過番茄、茄子、馬鈴薯、菸草等的土地。一般水田旱地都可栽培，但以肥沃深厚的砂質壤土較適。作高畦，畦幅一三〇公分為準。一畦栽二行，株間四十五公分為準，十公畝地栽三千三百株。栽植宜在下午太陽斜西後，苗應帶土掘起，栽植後勿使土壤過乾，降雨時使雨水迅速排出田外。追肥(下接第十二頁)

主要用人糞尿或豬糞尿。甜椒莖質脆弱易斷，發育時應擇立短小支柱，使主幹固定不動。病蟲害通常不嚴重。

④收穫 栽種後四十天開始收穫，應在果實尚未充分長大而仍青色時採收。初期果較大，後期果較小。採收時，最好用剪刀剪果梗基部（連株的一瓣）剪下。如用手採摘時，一手扶住果實着生處枝條，一手握住果梗基部，沿果梗和枝條交結處的離層，輕輕摘下。如不這樣，容易折斷枝條。採收期間很長，無論早栽或晚栽的，如栽培得法，都可繼續採收到五、六月為止。開始採收後的前三個月，收量較多，果形也大而豐滿。

⑤採種 選擇生育結果優良的植株，每株留取前期的果實五、六個。果色有三分之二變紅色時採下，放置室內後熟，待果實全部變紅色稍呈萎軟時，從果實中段橫切為二。用手指挖取種子晒乾後，剔除重量較輕的種子，就可貯藏待用。

三、番 茄

(品種：Break O'Day)

①特性 株形中等高大，果型近於球型或略扁，果形中大。果色深紅，不易裂果，肉質豐厚充實緊硬，品味優美，適於市場販賣。對於「萎凋病」和「果頂腐爛病」的抵抗力較強，因此產量比較可靠。

②播種期 北部八月上旬至三月上旬，中南部八月中旬至二月上旬。提早播種或延遲播種的，生育結果不良。澎湖地區因季節風關係，播種期限於八月中旬至九月上旬以及二月。

③栽培方法 利用苗床育苗。育苗方法和甜椒相同。十公畝種子（發芽率一〇〇%的）條播的約十二公分，撒播的約十五公分。苗高十二公分左右，有四、五片葉時，為栽植適期。本圃畦幅一五〇公分為準，一畦栽二行，畦的方向應南北向，以果實發生日趨病。株間四十五公分（單幹整株）至五〇公分（雙幹整株）。土壤選擇條件，移苗栽植澆水施肥等方法，大體和甜椒相同。但須注意下面幾點：①定植前一星期起，苗床中漸澆水。②插立支柱摘除側芽，施行單幹或雙幹整株。③隨時縛幹至支柱，勿使折倒。④氮肥一時不可施用過多。⑤澆水不可過濕過乾或時乾時濕。⑥染有病蟲害實和畸形的果實，幼小時隨時摘去拋出田外。⑦「石灰波爾多液」或「鹽基性硫酸銅」或「王銅」，至少苗床定植前噴一次，本圃中每隔二星期一次。全株萎凋的，株形生長不正常葉色黃綠鐵鎖的，或葉呈畸形的病株，及早拔除燒去。

④收穫 果頂實部呈現紅色時，即可採收。採收期間，早播的約一個半月，晚播的約一個月。

⑤採種 採種用的番茄，應當選自生育結果優良的植株（採種株預先作一標記），且具有原品種特性的完好無病的果實。果頂部呈現紅色時即可採下，放置室內待充分紅熟，然後橫切為二，自子室內挖出種子，盛入容器放置一日。容器不可用鐵器，否則種子變暗黑色，放置時不可加水，加水後立即會發芽。附著種子的膠質物發酵腐爛後，用水漂洗清淨，經晒乾後貯藏。

敬 請 交 通 界 注 意

敝行代客訂購下列各項車輛器材及零件・保證價格低廉交貨迅速

美國萬國汽車農具公司出品

International Harvester Export Co. U. S. A.

* 農 業 機 械
(Farm Equipment)
* 曳 引 車
(Crawler & Wheel Tractors)
* 載 重 汽 車
(Light & Heavy Duty Trucks)
* 交 通 客 車
(Bus)
* 特 種 汽 車
(Special Trucks)

* 動 力 引 擎
(Power Units)
* 築 路 機 械
(Road Construction Equipment)
* 起 重 吊 車
(Crawler & Truck Cranes)
* 林 場 器 材
(Logging Equipment)
* 各 種 零 件
(Spare Parts)

歡迎詢價！

敬請比較！

臺 灣 省 總 代 理

惠

豐

行

地址：臺北市開封街一段三十三號二樓

電話：二四三〇九 二二一七七