

主要用人糞尿或豬糞尿。甜椒莖質脆弱易斷，發育時應擇立短小支柱，使主幹固定不動。病蟲害通常不嚴重。

④收穫 栽種後四十天開始收穫，應在果實尚未充分長大而仍青色時採收。初期果較大，後期果較小。採收時，最好用剪刀剪果梗基部（連株的一瓣）剪下。如用手採摘時，一手扶住果實着生處枝條，一手握住果梗基部，沿果梗和枝條交結處的離層，輕輕摘下。如不這樣，容易折斷枝條。採收期間很長，無論早栽或晚栽的，如栽培得法，都可繼續採收到五、六月為止。開始採收後的前三個月，收量較多，果形也大而豐滿。

⑤採種 選擇生育結果優良的植株，每株留取前期的果實五、六個。果色有三分之二變紅色時採下，放置室內後熟，待果實全部變紅色稍呈萎軟時，從果實中段橫切為二。用手指挖取種子晒乾後，剔除重量較輕的種子，就可貯藏待用。

三、番 茄

(品種：Break O'Day)

①特性 株形中等高大，果型近於球型或略扁，果形中大。果色深紅，不易裂果，肉質豐厚充實緊硬，品味優美，適於市場販賣。對於「萎凋病」和「果頂腐爛病」的抵抗力較強，因此產量比較可靠。

②播種期 北部八月上旬至三月上旬，中南部八月中旬至二月上旬。提早播種或延遲播種的，生育結果不良。澎湖地區因季節風關係，播種期限於八月中旬至九月上旬以及二月。

③栽培方法 利用苗床育苗。育苗方法和甜椒相同。十公畝種子（發芽率一〇〇%的）條播的約十二公分，撒播的約十五公分。苗高十二公分左右，有四、五片葉時，為栽植適期。本圃畦幅一五〇公分為準，一畦栽二行，畦的方向應南北向，以果實發生日趨病。株間四十五公分（單幹整株）至五〇公分（雙幹整株）。土壤選擇條件，移苗栽植澆水施肥等方法，大體和甜椒相同。但須注意下面幾點：①定植前一星期起，苗床中漸漸澆水。②插立支柱摘除側芽，施行單幹或雙幹整株。③隨時縛幹至支柱，勿使折倒。④氮肥一時不可施用過多。⑤澆水不可過濕過乾或時乾時濕。⑥染有病蟲害實和畸形的果實，幼小時隨時摘去拋出田外。⑦「石灰波爾多液」或「鹽基性硫酸銅」或「王銅」，至少苗床定植前噴一次，本圃中每隔二星期一次。全株萎凋的，株形生長不正常葉色黃綠鐵鎖的，或葉呈畸形的病株，及早拔除燒去。

④收穫 果頂實部呈現紅色時，即可採收。採收期間，早播的約一個半月，晚播的約一個月。

⑤採種 採種用的番茄，應當選自生育結果優良的植株（採種株預先作一標記），且具有原品種特性的完好無病的果實。果頂部呈現紅色時即可採下，放置室內待充分紅熟，然後橫切為二，自子室內挖出種子，盛入容器放置一日。容器不可用鐵器，否則種子變暗黑色，放置時不可加水，加水後立即會發芽。附著種子的膠質物發酵腐爛後，用水漂洗清淨，經晒乾後貯藏。

敬 請 交 通 界 注 意

敝行代客訂購下列各項車輛器材及零件・保證價格低廉交貨迅速

美國萬國汽車農具公司出品

International Harvester Export Co. U. S. A.

* 農 業 機 械
(Farm Equipment)
* 曳 引 車
(Crawler & Wheel Tractors)
* 載 重 汽 車
(Light & Heavy Duty Trucks)
* 交 通 客 車
(Bus)
* 特 種 汽 車
(Special Trucks)

* 動 力 引 擎
(Power Units)
* 築 路 機 械
(Road Construction Equipment)
* 起 重 吊 車
(Crawler & Truck Cranes)
* 林 場 器 材
(Logging Equipment)
* 各 種 零 件
(Spare Parts)

歡迎詢價！

敬請比較！

臺 灣 省 總 代 理

惠

豐

行

地址：臺北市開封街一段三十三號二樓

電話：二四三〇九 二二一七七