

臺中縣龍井鄉 栽培洋香瓜實例

龍井鄉福田村 王錫琴

可栽我培洋香瓜引已起農友們興趣。現在把本人栽培經過，列舉於後，供農友們參考。

一、栽培地的環境和土質
選擇日照充足，排水良好的砂土或砂壤土栽培。已有栽培過瓜類的地方，避免連栽。同一塊地，至少需要三年的休閒後，才可以栽培。

二、播種
二月上旬至三月上旬播種，播種以直播為佳。土壤耕翻後，作高畦，行距一·六公尺至二公尺，株距〇·五公尺，（澎湖的試驗，是行距二·一公尺，株距一·二公尺）。每一株距處掘穴，施下基肥，種子播種前，先催芽，種子發芽後在本圃播種。播種時盡量選擇溫暖無風之日，每穴平放種子三、四粒，然後覆蓋細土，堆肥，隱沒種子，上面覆稻糠或稻草，以防乾燥。

三、施肥
以速效性肥料為主，氮肥不可過

多，磷、鉀肥宜多用。每一分地，用堆肥約六〇〇公斤作基肥。氮肥以人糞尿為主，約一、二〇〇公斤，其次為硫酸銨約一二公斤，作為追肥。磷肥用過磷酸石灰或熔磷六〇公斤，鉀肥用草木灰一二〇公斤或氯化鉀一八公斤，大部作基肥。夏季雨水多，肥料易流失，追肥要分四、五次施用。施用時注意不要使根部受傷，才可以完全吸收肥份。

四、整株
母蔓五、六葉時摘心，使發生「子蔓」。子蔓伸長到畦溝前再摘心，使發出「孫蔓」。孫蔓上結果，結幼果時再摘心，以促進瓜實的生長。

五、管理
播種發芽後，繼續除去發育不良幼苗，最後每穴留二株。瓜蔓未匍匐前，充分中耕除草。苗期起，用一斗式波爾多液，每隔十日在葉裏面噴藥一次。開花期及幼果期暫停噴藥，以免影響結果。施追肥後培土，並全畦面敷草，防止果實腐敗。苗期忌乾燥，須注意灌水，常須保持適當水份。陰雨時又須注意排水，瓜蔓繁茂後，根旁要插標記，作為灌水目標。

六、採收
瓜實有充分香味，果皮呈黃色的澤時，是採收適期。過早採收，缺少香氣甜味。過遲採收，瓜肉變軟，不耐貯運，失去商品價值。
七、產量
每一分地以種植三〇〇株計算，平均每株可結果五顆。以臺北市場每顆最低市價六元，即每株可售價三〇元，一分之地可收入九、〇〇〇元。除去工資、肥料、運什費等，統利益約有八、〇〇〇元左右，利益的確甚大。

專營優良農林種苗！！

- 林木種子：橡樹、柚木、鐵刀木、茄冬、相思樹、木麻黃、鳳凰木、銀合歡、大葉合歡、苦茶子等
- 林木種苗：吉野杉、相思樹、木麻黃、檫樹、鳳凰木、廣葉杉、赤松苗等
- 蔬菜種子：日本產ブリチャード落茄、白カキチヤ（白高菜）、落合節成胡瓜、時無大根、大阪白菜、丸葉山東菜子等
- 各種繪袋入花種子：每袋一元五角
- 球根：日本產蘭花頭（グラチラス球根）（赤色、白色等）



◀寄即索待表格價▶

各種種苗
品質優良
請從速賜購

臺北市延平北路甘谷街十一號
臺灣實驗農林種苗行
電話四三七五一號

益隆農化工廠

榮譽出品
新強力綜合殺蟲劑
（用藝園村農林山）



I-LUNG AGRICULTURAL & CHEMICAL FACTORY

薦推生先焄燭陳 學大灣臺立國 授教院學農

多利農 Trilon 是現代科學最進步之農藥，能同時一併殲滅田園所發生之青蟲、龜神、夜盜蟲、鑽心蟲、跳蟲、蠶等，能殺滅傳染病菌等，一切害蟲實屬山林農村界所熱求之綜合性滅蟲妙藥也。（用試迎歡）

微地方推銷處條件從優
說明書備索，贈送樣品
請付送費三元郵票。

發行處：
臺北市中正路一九九九號
電話：二二二〇〇號
廠址：
臺北市地化街一段六三號