

臺中縣龍井鄉 栽培洋香瓜實例

龍井鄉福田村 王錫琴

可栽我培洋香瓜引已起農友們興趣。現在把本人栽培經過，列舉於後，供農友們參考。

一、栽培地的環境和土質
選擇日照充足，排水良好的砂土或砂壤土栽培。已有栽培過瓜類的地方，避免連栽。同一塊地，至少需要三年的休閒後，才可以栽培。

二、播種
二月上旬至三月上旬播種，播種以直播為佳。土壤耕翻後，作高畦，行距一·六公尺至二公尺，株距〇·五公尺，（澎湖的試驗，是行距二·一公尺，株距一·二公尺）。每一株距處掘穴，施下基肥，種子播種前，先催芽，種子發芽後在本圃播種。播種時盡量選擇溫暖無風之日，每穴平放種子三、四粒，然後覆蓋細土，堆肥，隱沒種子，上面覆稻糠或稻草，以防乾燥。

三、施肥
以速效性肥料為主，氮肥不可過

多，磷、鉀肥宜多用。每一分地，用堆肥約六〇〇公斤作基肥。氮肥以人糞尿為主，約一、二〇〇公斤，其次為硫酸銨約一二公斤，作為追肥。磷肥用過磷酸石灰或熔磷六〇公斤，鉀肥用草木灰一二〇公斤或氯化鉀一八公斤，大部作基肥。夏季雨水多，肥料易流失，追肥要分四、五次施用。施用時注意不要使根部受傷，才可以完全吸收肥份。

四、整株

母蔓五、六葉時摘心，使發生「子蔓」。子蔓伸長到畦溝前再摘心，使發出「孫蔓」。孫蔓上結果，結幼果時再摘心，以促進瓜實的生長。

五、管理

播種發芽後，繼續除去發育不良幼苗，最後每穴留二株。瓜蔓未匍匐前，充分中耕除草。苗期起，用一斗式波爾多液，每隔十日在葉裏面噴藥一次。開花期及幼果期暫停噴藥，以免影響結果。施追肥後培土，並全畦面敷草，防止果實腐敗。苗期忌乾燥，須注意灌水，常須保持適當水份。陰雨時又須注意排水，瓜蔓繁茂後，根旁要插標記，作為灌水目標。

六、採收

瓜實有充分香味，果皮呈黃色的澤時，是採收適期。過早採收，缺少香氣甜味。過遲採收，瓜肉變軟，不耐貯運，失去商品價值。

七、產量

每一分地以種植三〇〇株計算，平均每株可結果五顆。以臺北市場每顆最低市價六元，即每株可售價三〇元，一分之地可收入九、〇〇〇元。除去工資、肥料、運什費等，統利益約有八、〇〇〇元左右，利益的確甚大。

專營優良農林種苗！！

- 林木種子：橡樹、柚木、鐵刀木、茄冬、相思樹、木麻黃、鳳凰木、銀合歡、大葉合歡、苦茶子等
- 林木種苗：吉野杉、相思樹、木麻黃、檫樹、鳳凰木、廣葉杉、赤松苗等
- 蔬菜種子：日本產ブリチャード落茄、白カキチヤ（白高菜）、落合節成胡瓜、時無大根、大阪白菜、丸葉山東菜子等
- 各種繪袋入花種子：每袋一元五角
- 球根：日本產蘭花頭（グラチラス球根）（赤色、白色等）



◀寄即索待表格價▶

臺北市延平北路甘谷街十一號
臺灣實驗農林種苗行

電話四三七五一號

益隆農化工廠

榮譽出品
新強力綜合殺蟲劑
（用藝園村農林山）



I-LUNG AGRICULTURAL & CHEMICAL FACTORY

國立臺灣大學農學院教授陳炯炎先生推薦

多利農 Trilon 是現代科學最進步之農藥，能同時一併殲滅田園所發生之青蟲、龜神、夜盜蟲、鑽心蟲、跳蟲、蠅等由水肥傳來之傳染病菌等一切害蟲實屬山林農村界所熱求之綜合性滅蟲妙藥也。

（用試迎歡）

微地方推銷處條件從優說明書備索，贈送樣品請付送費三元郵票。

發行處：臺北市中正路一九九號
電話：二二二〇〇號

廠址：臺北市地化街一段六三號