



問：甘蔗每公頃的標準收穫量

應該有多少公斤？

和量收準標的蔗甘 度密培栽的宜適最

①甘蔗每公頃的標準收穫量
②種植甘蔗最適宜的畦幅和株間各為多少？每公頃應種多少株？（臺南縣將軍鄉蔡仁樹）

答：①甘蔗每公頃標準收成量應為多少，要看蔗田的種別，甘蔗的品種，和栽培方法等因子而大有出入。一般說來，目前一般的標準大致如下：

- 田種別 每公頃甘蔗標準收量
- 兩期作水田 十萬公斤
- 輪作田 八萬公斤
- 平地旱田(畑) 六萬公斤
- 山旱田(畑) 四—五萬公斤

病疾的生發易容羊養

日後，身瘡毛亂，起立困難。因不知實何藥品治療，五六天後便因下瀉劇烈而死亡了。接着又有一隻如此死亡。請問這是什麼病，怎樣預防和治療？（臺中縣清水鎮虞運滋）



問：我家養了二三十隻山羊，在月初有一隻羊忽然大便變稀，不思。飲食三四

甘蔗有多少副產物？

問：甘蔗的副產物有多少？（蔡仁樹）

答：甘蔗的副產物有：①蔗葉，約為蔗莖產量的一成，②蔗頭和枯死莖，約為蔗莖產量的百分之五，③蔗尾（蔗梢），約為蔗莖產量的二成。（都英彪）

五公尺，株間則為〇·三公尺，每公頃種植双芽苗二萬四千本；或採用畦幅一·二〇公尺，株間〇·四公尺，每公頃種植双芽苗二萬零八百四十本。

答：你的山羊病，依你所說的症狀看來，可能是急性腸炎。至於身體瘦弱而毛亂，起立困難，可能是有寄生蟲所致。對症下藥的治療法是用腸胃消炎片（スルフアグアニチン）與重曹合用，一日三次，每次用消炎片的量是以山羊體重為準，約每重十公斤用藥一公分，重曹等量。此藥任何西藥房都有賣。沒有什麼好方法來預防，主要的是平常給以較佳的飼料，使營養較好，身體強壯，又必須注意避免寄生蟲的感染，畜舍要保持清潔衛生。

關於是否有寄生蟲寄生，你是否將死羊解剖了，看看在肝臟中有無「肝蛭」？這是一片一片如小葉狀的吸蟲，在膽中寄生為多。因為臺灣多雨，管地濕，寄生很多，可使羊受到很大的損失，這種蟲寄生後，容易引起其他的疾病。（省農業試驗所黃立羣）

餵豬是否要過飽？

問：俗語說：「填豬肥，填狗瘦，填小孩黃酸桶。」請問餵豬是否要十分飽的必要？（苗栗縣通霄鎮蕭寶炬）

答：豬的食慾旺盛，對濃厚的飼料，消化利用力大，但對粗飼料是不大會利用，所以

養豚與養牛馬不同，必須給以濃厚的飼料，如大豆餅、花生餅、米糠、麵皮、甘藷簽之類，生長才能快速至於餵量。在幼豬發育旺盛時期，應該充分給與，但也不可過量，過量浪費飼料，不大經濟。餵量大概如下：

小豬按體重十五分之一至二十分之一。（例如三〇斤重的小豬，每天給與二斤混合飼料。）

母豬、肥豬按體重三十分之一至四十分之一。以上所給與之量，以乾物計算。



此外每頭每天應加給青飼料，小豬〇·五—一公斤（甘藷蔓或青菜），母豬、肥豬一—二公斤（甘藷蔓或青菜）。（省農業試驗所鄭謀平）

效無者寫抄張紙備自；意注（社本來寄下剪線此沿請後案答好填）

年豐 測驗答案表

- (一) 姓名：.....
- (二) 住址：.....
- (三)
- (四)
- (五)
- (六)
- (七)
- (八)
- (九)
- (十)
- (十一)
- (十二)
- (十三)
- (十四)
- (十五)
- (十六)
- (十七)
- (十八)
- (十九)
- (二十)

