

圖畫
說明

誘殺水稻三化螟虫



(一) 本省各區農林改良場，和一部份鄉鎮，

(二) 孵化出來的螟蟲幼蟲，在侵入稻莖以前

都已經設置「誘蛾燈」。根據誘蛾燈捉到的螟蛾數，可以測定各地區螟蛾發生的最盛時期，由鄉鎮公所公告週知。

(一) 用「安特靈」原液一份，加清水五百份，在螟蛾發生最盛期的十天以內，噴在稻株的中上部

就是「茵都靈」，原名 EDRIN，日名ホン・ドリン，原液有毒，要注意。



，就被「安特靈」毒死了。

(四) 螟蛾發生的最盛時期十天以後至二星期以內，螟蟲已經鑽進稻莖內，要應用二千倍的富粒多液，才可以殺死稻莖裏的螟蟲。

(五) 如使用三加侖(ガロン)式的背囊式噴霧器，可先裝滿清水，然後用注射器小心從「富粒多」瓶中吸出五・六一六CC的原液，加入清水中，用木棒或竹竿攪拌後，即可應用。



附註：農友們需要購買「安特靈」和「富粒多」的，可向當地縣政府或農會申請登記，彙報農林廳，轉請農復會及美援會購買，可以分期付款。

(六) 噴射富粒多時，要穿戴橡皮製的手套，衣服，鞋，並應用玻璃布的面罩，噴射時要在稻株的中下部