


法理處及血出般一甲




血管
出血也有
不同，靜
脈流出的
速度較慢
，色深紅
，血是由
四肢回流
至心臟。
動脈流出
的較急，
色鮮紅，
血是由心
臟流至四
肢的。

識常救急



傷外 四



部臂



部頸



部股



手一用





部腋




部面


一般傷口出血如
不太嚴重時，多採用
壓力止血法。如直接
壓迫傷口時就應將清
潔紗布蓋在傷口上，
用手使力壓之，不直
接壓傷口時也可用手
使力壓流血的血管部
位血就會停止的。例
如面部、頸部、臂部
、腋部、股部等部位
，可參看左圖。



血止條布




血止管皮橡



用細橡
皮管(ホ
ス)或布條
緊縛受傷的
上肢或下肢
(縛時勿過
緊，且應每
隔二小時放
鬆一次，然
後再緊紮起
來。)施用
以上二法時
，靜脈出血
時壓力或緊
縛應用在出
血處之下端
，如動脈則
應用在出血
處之上端。

3.

止血除可用紗布棉花壓在傷口上以捲帶環繞包緊外，要應使傷者安靜切勿移動出血處，保持傷者舒適溫暖，避免暈厥，並勿給傷者飲料，同時速請醫生處理。



上口傷在壓花棉布紗用
。紫色繞環帶捲以

種兩有折骨1.

乙：骨折



在未作適當處理前不能移動傷者，以免受傷情形更為嚴重。只能使傷者平躺下，應注意其舒適與溫暖或極痛，以免休克（即暈厥）。

複雜骨折



簡單骨折



如骨折無論有無骨外露或被傷時，應用木板托好，以膠布或綑帶固定後，速送醫院等候醫師處理。

