

# 我怎樣栽培黃香瓜

趙順福 臺中縣大肚鄉

臺中縣大肚鄉所產的黃香瓜，又名香瓜或甜瓜，是大家喜歡吃的。到了夏季，田間只見一片綠油油的瓜園，裏面結着黃金色的瓜，最為美觀。黃香瓜肉質厚軟，富有香甜味，營養豐富，是一種消暑良劑。它的栽培是利用第一期水稻的農作，每年總有多量的生產，對於農友們的家庭經濟，很有幫助。

## (一) 適期的栽培

黃香瓜的栽培時期，要同時考慮到種植適期，並注意栽培後不影響水稻的生長發育。依據本省中部的栽培情形，在第一期水稻將到「乳熟期」，或水稻收穫前十五天栽植為宜。



播種以點播為好，播種深度一·五公分。行距和株間距離，要看土質、氣候等酌量變通。一般行距以水稻隔十一二行，在株間作十五公分寬的畦幅，株距一·五—二公尺。畦幅的寬狹，對於產量有影響。

## (二) 施肥和整地

黃香瓜播種後，水稻到「黃熟期」立即收割，收穫時注意不要傷害瓜苗。水稻收穫後，用犁犁起兩側土壤，再用鋤頭打碎大土塊作成畦。

普通一分地施用硫酸銨八十一九十斤，過磷酸石灰四十一五十斤，硫酸鉀三十一四十斤。過磷酸石灰和硫酸鉀，整地時施在兩側做基肥。硫酸銨做追肥，分做二次施用，施用時務必在開花前，離根部半尺處掘小穴施用。

## (三) 栽培後的管理

① 補植和間苗：播種後三十四天發芽，幼苗出土達二—三分後，如見有不發芽或發芽不良的，可行補播或補植，但須要選陰天。如有過密的，用「移植錫」掘起，每穴留生育良好的二—三株。  
② 摘心：栽培甜瓜希望結實繁多，非行摘心不可。即在「真葉」三—四葉時，摘去心部使多生側蔓。蔓留四、五條，每條留果三、四個，從結果枝所生的側枝都除去，以免莖葉過份繁茂，發育反而不良。

③ 鋪草：要使果實產量多，須要保護瓜蔓，使蔓繁茂。所以在瓜園應鋪以稻稈，使瓜面不與土地接觸，才可以自由蔓延。鋪草一方面能防止雜草發生，一方面能防止水分蒸發。

④ 灌溉：黃香瓜在生育期間須要充分的水分供給，一般每隔十日灌溉一次，灌溉水以五—十公分為恰當。灌溉一天後，需要排水，才不致侵害根部。

⑤ 蟲害：黃香瓜幼苗常受瓜守，瓜蠅或瓜螟幼蟲為害，蛀食嫩葉及莖或瓜果，使瓜株枯萎，停止生長，常有落果在地上。防治黃香瓜蟲害，以撒布砒酸鉛為宜，DDT及BHC均能發生藥害，不宜施用。

## (四) 收穫的適期

黃香瓜的成熟程度，影響市場價格，所以要在適當的成熟期來收穫。瓜皮變黃色時，表示已達充分的成熟，就可以收穫。

(上接第八頁「如何產生株結實的木瓜」)

已授粉的雌花，應該掛牌標明父母本和授粉日期，以便將來辨認。授粉七天後，可以把紙袋除去。每朵授粉過的雌花，產生一個果實，裏面有種子五百到一千粒。

這個產生多量結實株的方法，在澳洲(オーストラリヤ)和美國的農民早經實行。理論上雌株和雜性同株交配，產生的後代只有雌株和雜性同株，沒有雄株，事實上，雌株還是有的，大約一百株中只有一株雌株，這個比例已經很小，不足重視。所以農友們只要依照上面說明去辨別雌株和雜性同株，再依法進行人工控制授粉，就可以大量產生株結實的木瓜樹了。

附註：花的各部份名稱，請參看本刊四卷十期第六頁圖二「花的構造」。

## 除草劑 24 D 石原

### 可以解決除草之勞苦!

人工手取除草每分地要七點鐘

使用24-D原藥每畝只需15元



久旱不雨 影響插秧 即時使用 促進生長 確保增產

說明書函索即寄，請附郵票4角△

### 臺灣總代理店 大豐農藥行

臺北市寧夏路23號 郵政劃儲臺灣10620號

各處分銷處	基隆	台北	新竹	台中	台南	高雄	屏東	嘉義	台南	高雄	屏東	基隆	台北	新竹	台中	台南	高雄	屏東	嘉義	台南	高雄	屏東
-------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----