


→(五)三個

月中雞，再行驅除
蛔蟲。晚間餵給
美國製庇恩片劑
(P.N)半片，停
止飼料，只給片劑
一次，第二天早晨
就瀉出蛔蟲。或用
阿司卡利肯(アスカ
リケン)，每隻
〇・二一〇・三公
分，混在早晨飼料
中，連服二天。



→(七)產卵期中

的母雞，儘量避免服
用或注射藥劑，以免
影響產卵能力。
附註：「庇恩」簡稱
P.N，原名 Phenolph
thaleine-Nicotine 臺北市
開封街一段三三號惠豐
行批發，各飼料行出售
，每片約五角。




→(六)雌雞開

始產卵前，用「庇
恩」一片，再驅除蛔
蟲，並先注射家禽霍
亂血清五—一〇cc，
一星期後再注射家禽
霍亂菌苗二—三cc。
新城雞瘟疫苗，每隻
先注射一cc，三、四
日後再注射一cc。

荸薺的定植

·陳玉壽·

本刊五卷五期第八頁「荸
薺栽培要點」文內，講到臺北
陽明山的農友，定植荸薺時，
利用一種丁字形的栽植器，測
量栽植距離。因為說明很簡單
，現在再用圖畫表明如下：



圖一：種植第一行時，先橫倒種植器，種植器
的柄向右，「乙」端和田畦接觸，種植器的柄和畦
邊平行，在「丙」點種植一株荸薺。第一株種植後
，種植器保持原來橫倒的形狀，向右移動，種植器
的「丁」點，靠近第一株荸薺時，在「丙」端插植
第二株，這樣繼續種完第一行。

圖二：第一行種完以後，把種植器放正，「甲
」端和「乙」端接近第一行種的第一、二株，在「
丙」點插植一株荸
薺，種植器向右移
動一株的距離，在
「丙」點種植第二
株，這樣繼續種完
第二行。

第三行以及以
後的種植，都和第
二行相同。種植完
畢後，田裏的荸薺
排成整齊的等腰三
角形。

