



【稻水】
 北區(臺北、新竹區) 臺北區、每兩十日，分別舉行第二、三次中耕除草。新竹區、第三次中耕除草。北區約提早三日。本月份澆水不必太深，如澆水不足，維持土面乾爽，不生龜裂即可。如有鐵甲蟲或泥龜發生，撒佈5%DDT粉劑或1%BHC粉劑均有功效。(每公頃用二五公升)
 東部(臺東、花蓮區) 晚稻插田，陸續進行第二、三次中耕除草。澆水不足，可進行輪流澆灌。(每兩七日九次，澆水二寸左右)
 中南部：上旬除種一次並刈除田畦什草，保持清潔，防治害蟲。
 ①苗圃整地，施堆肥，做四英尺寬平床，中央開小溝，撒草木灰或火燒土七、八坪。
 ②栽種種苗，覆土並蓋谷殼，促進發芽。
 ③種苗用盆，小的二〇公升，大的三〇公升，約為五〇塊一七〇塊。(本圃栽種面積一分地為準)
 ④注意澆灌追肥，並行補種。請藤伸長一尺時，施稀釋水肥一擔。一、四三至四四年期甘蔗，陸續收穫完畢。
 二、四四至四五年期：①各地一律中耕除草澆灌。
 ②去年七、八月種植的行第二次培土，培土高度二五—三〇公分
 ③中下旬種植一期期仔甘蔗。

【請日】
 注意澆灌追肥，並行補種。請藤伸長一尺時，施稀釋水肥一擔。一、四三至四四年期甘蔗，陸續收穫完畢。
 二、四四至四五年期：①各地一律中耕除草澆灌。
 ②去年七、八月種植的行第二次培土，培土高度二五—三〇公分
 ③中下旬種植一期期仔甘蔗。

【黃麻】
 黃麻繁殖的，苗床播種，乾旱時噴水澆灌。
 (一)實生苗繁殖的，苗床播種，乾旱時噴水澆灌。
 三次間拔，勻苗，補栽，定植。補栽大蠶蜂或切根蟲。
 中耕除草，施用第一、二次追肥後培土，雨時排水，乾時澆水。
 ②一畝麻田，整地施用堆肥，劃開溝排水溝，肥平碎土，開溝排水溝，將溝邊或浸過水的種子，薄播土壓，除草中耕，注意澆灌排水，抽發密蟲，拔除病株。
 意澆排水，初生本葉時行第一次間拔，

【茶】
 苗圃除草。實生苗圃及扦插苗圃均宜除草。
 ②幼木茶園播種綠肥(如苦勞豆、綠豆等)。
 ③雨季前整修茶園間道，噴殺並疏澆排水溝等，以防止雨水沖蝕。
 ④茶研病於本月開始發生，摘除病叶。蟲害如上月，繼續防治。
 ①中耕除草(新植鳳梨園第四次中耕除草)
 ②繼續除去冠芽萌芽。
 ③夏果防蟻，除冠芽萌芽工作完了後，扶直起下部葉片，尖端用竹篾縛緊，保護果實，以防晒傷。或者用乾茅，蓋在果實有強光射來的一面，也可以保護果實避免晒傷。

【茶】
 苗圃除草。實生苗圃及扦插苗圃均宜除草。
 ②幼木茶園播種綠肥(如苦勞豆、綠豆等)。
 ③雨季前整修茶園間道，噴殺並疏澆排水溝等，以防止雨水沖蝕。
 ④茶研病於本月開始發生，摘除病叶。蟲害如上月，繼續防治。
 ①中耕除草(新植鳳梨園第四次中耕除草)
 ②繼續除去冠芽萌芽。
 ③夏果防蟻，除冠芽萌芽工作完了後，扶直起下部葉片，尖端用竹篾縛緊，保護果實，以防晒傷。或者用乾茅，蓋在果實有強光射來的一面，也可以保護果實避免晒傷。

【花生】
 保持株距三公分。苗三公分左右時，行第二次間拔，保持株距四、五、六公分，其後二、三星期行第三次間拔，勻苗定植，株距九—二二公分。
 ①高雄、澎湖地區，播種較晚的，應在本月內播種完畢。
 ②各地三月播種的，除深中耕開拔，施鉀肥外，料作追肥，行低培土。
 ③中南部和東部，二月間播種的，中耕，除雜草，完成培土工作。
 ④東部一月間播種的，停止中耕，刈除高草雜草，拔除病死株殘體。
 北部①天氣陰雨或冷熱不定時，用魚藤精三〇〇倍稀釋液噴殺茶毒。
 ②採摘應防粗採，初齡茶樹尤應注意。
 ③中耕除草最遲應於上旬完成。
 中南部：①採茶適時施行。
 ②繼續採茶。

【梨】
 直播的：蘿蔔「美濃早生」群、「梅花」群、「櫻桃蘿蔔」群、「時無一」胡蘿蔔(限高冷地和澎湖)。
 大芥菜(牛脊甲)，芥藍，莖菜(限高冷地)，萵苣，莖菜(限高冷地)，萵苣，莖菜(限高冷地)，萵苣，莖菜(限高冷地)。
 莖菜，番杏，芹菜，芫荽，胡瓜(冬栽大胡瓜群適北部，夏栽大胡瓜群適南部，夏栽節成種適中部)，甜瓜(非洋種)，西瓜，冬瓜(限北部和澎湖)，南瓜(澎湖)，越瓜，扁蒲，菜香梨，苦瓜(北部)，絲瓜，菜豆(中南部限矮性種，北部變性種矮性種均可播種)，豌豆(限高冷地)。

【梨】
 直播的：蘿蔔「美濃早生」群、「梅花」群、「櫻桃蘿蔔」群、「時無一」胡蘿蔔(限高冷地和澎湖)。
 大芥菜(牛脊甲)，芥藍，莖菜(限高冷地)，萵苣，莖菜(限高冷地)，萵苣，莖菜(限高冷地)。
 莖菜，番杏，芹菜，芫荽，胡瓜(冬栽大胡瓜群適北部，夏栽大胡瓜群適南部，夏栽節成種適中部)，甜瓜(非洋種)，西瓜，冬瓜(限北部和澎湖)，南瓜(澎湖)，越瓜，扁蒲，菜香梨，苦瓜(北部)，絲瓜，菜豆(中南部限矮性種，北部變性種矮性種均可播種)，豌豆(限高冷地)。

【梨】
 直播的：蘿蔔「美濃早生」群、「梅花」群、「櫻桃蘿蔔」群、「時無一」胡蘿蔔(限高冷地和澎湖)。
 大芥菜(牛脊甲)，芥藍，莖菜(限高冷地)，萵苣，莖菜(限高冷地)，萵苣，莖菜(限高冷地)。
 莖菜，番杏，芹菜，芫荽，胡瓜(冬栽大胡瓜群適北部，夏栽大胡瓜群適南部，夏栽節成種適中部)，甜瓜(非洋種)，西瓜，冬瓜(限北部和澎湖)，南瓜(澎湖)，越瓜，扁蒲，菜香梨，苦瓜(北部)，絲瓜，菜豆(中南部限矮性種，北部變性種矮性種均可播種)，豌豆(限高冷地)。

【雞】
 勤於產卵的母雞，應加給富於營養的飼料，以補償其體力的損耗。中雞切忌密飼，應給予適當運動場所，以免影響發育。
 定期舉行驅蟲及預防注射。

【豬】
 肉用仔豬，應早去勢，以免因發情影響生長速度。充分利用產產過剩的甘藷調製成埋草備用。
 仔豬定期驅蟲並實施預防注射。

【牛】
 離乳犍牛及春耕役用牛，應給予富於營養的飼料。犍牛須給適當的運動。

黃牛及印度牛配種。分娩前後的母牛管理應特別注意。

①三月份前播種的種類，約經一個月苗床期，再移栽到本田。②馬鈴薯(限高冷地)，薑，藕，荸薺，用種物栽種。③江南竹筍，蕪菜，九條蔥，西螺蔥，韭菜，金針菜，用分株繁殖法栽種。

國曆	農曆	星期	節日和紀念日	記	事
15	廿三	五			
16	廿四	六			
17	廿五	日			
18	廿六	一			
19	廿七	二			
20	廿八	三			
21	廿九	四			谷雨
22	月初一	五			
23	初二	六			
24	初三	日			
25	初四	一			
26	初五	二			
27	初六	三			
28	初七	四			
29	初八	五			
30	初九	六			
1	十月初九	五			
2	十月初十	六			
3	十一日	日			
4	十二日	一	兒童節		
5	十三日	二	清明		
6	十四日	三			
7	十五日	四	世界衛生日		
8	十六日	五			
9	十七日	六			
10	十八日	日			
11	十九日	一			
12	二十日	二			
13	廿一日	三			
14	廿二日	四			
15	廿三日	五			