



# 農業信箱

### 請來信詢問的農友們注意！

- 1 本信箱專為農友服務，解答農業上發生的實際問題；涉於空論或學理方面的問題，恕不答覆。
- 2 來信時，務請在信紙上寫明姓名及詳細地址；姓名地址不明者，恕不答覆。
- 3 來信前，請先查看本刊已出版各期，是否你的問題早已發表過了。
- 4 問題請分條列出，有關情形並須詳細說明。
- 5 信紙請只寫一面，不要兩面寫。
- 6 病害或蟲害問題，請附寄標本。
- 7 除專門名詞外，請勿用外國文字書寫。
- 8 農校考試測驗問題，不在本信箱解答範圍之內。

## 雜糧



問：落花生下種後幾天可以收成？(苗栗縣後龍鎮張來播)

答：本省小粒種的落花生播下後，若有雨水滋潤，一星期左右就可發芽。種子發芽後三、四十天開花，再過六十天左右，就可以收穫。第一期應適期收穫，以免影響後作。

問：落花生下種後幾天可以收成？(苗栗縣後龍鎮張來播)

答：本省小粒種的落花生播下後，若有雨水滋潤，一星期左右就可發芽。種子發芽後三、四十天開花，再過六十天左右，就可以收穫。第一期應適期收穫，以免影響後作。

問：落花生下種後幾天可以收成？(苗栗縣後龍鎮張來播)

答：本省小粒種的落花生播下後，若有雨水滋潤，一星期左右就可發芽。種子發芽後三、四十天開花，再過六十天左右，就可以收穫。第一期應適期收穫，以免影響後作。

問：落花生下種後幾天可以收成？(苗栗縣後龍鎮張來播)

答：本省小粒種的落花生播下後，若有雨水滋潤，一星期左右就可發芽。種子發芽後三、四十天開花，再過六十天左右，就可以收穫。第一期應適期收穫，以免影響後作。

問：落花生下種後幾天可以收成？(苗栗縣後龍鎮張來播)

答：本省小粒種的落花生播下後，若有雨水滋潤，一星期左右就可發芽。種子發芽後三、四十天開花，再過六十天左右，就可以收穫。第一期應適期收穫，以免影響後作。

問：落花生下種後幾天可以收成？(苗栗縣後龍鎮張來播)

答：本省小粒種的落花生播下後，若有雨水滋潤，一星期左右就可發芽。種子發芽後三、四十天開花，再過六十天左右，就可以收穫。第一期應適期收穫，以免影響後作。

問：落花生下種後幾天可以收成？(苗栗縣後龍鎮張來播)

答：本省小粒種的落花生播下後，若有雨水滋潤，一星期左右就可發芽。種子發芽後三、四十天開花，再過六十天左右，就可以收穫。第一期應適期收穫，以免影響後作。

問：落花生下種後幾天可以收成？(苗栗縣後龍鎮張來播)

答：本省小粒種的落花生播下後，若有雨水滋潤，一星期左右就可發芽。種子發芽後三、四十天開花，再過六十天左右，就可以收穫。第一期應適期收穫，以免影響後作。

問：落花生下種後幾天可以收成？(苗栗縣後龍鎮張來播)

答：本省小粒種的落花生播下後，若有雨水滋潤，一星期左右就可發芽。種子發芽後三、四十天開花，再過六十天左右，就可以收穫。第一期應適期收穫，以免影響後作。

問：落花生下種後幾天可以收成？(苗栗縣後龍鎮張來播)

答：本省小粒種的落花生播下後，若有雨水滋潤，一星期左右就可發芽。種子發芽後三、四十天開花，再過六十天左右，就可以收穫。第一期應適期收穫，以免影響後作。

問：落花生下種後幾天可以收成？(苗栗縣後龍鎮張來播)

答：本省小粒種的落花生播下後，若有雨水滋潤，一星期左右就可發芽。種子發芽後三、四十天開花，再過六十天左右，就可以收穫。第一期應適期收穫，以免影響後作。

龍鎮張來播)

問：落花生下種後幾天可以收成？(苗栗縣後龍鎮張來播)

答：本省小粒種的落花生播下後，若有雨水滋潤，一星期左右就可發芽。種子發芽後三、四十天開花，再過六十天左右，就可以收穫。第一期應適期收穫，以免影響後作。

問：落花生下種後幾天可以收成？(苗栗縣後龍鎮張來播)

答：本省小粒種的落花生播下後，若有雨水滋潤，一星期左右就可發芽。種子發芽後三、四十天開花，再過六十天左右，就可以收穫。第一期應適期收穫，以免影響後作。

問：落花生下種後幾天可以收成？(苗栗縣後龍鎮張來播)

答：本省小粒種的落花生播下後，若有雨水滋潤，一星期左右就可發芽。種子發芽後三、四十天開花，再過六十天左右，就可以收穫。第一期應適期收穫，以免影響後作。

問：落花生下種後幾天可以收成？(苗栗縣後龍鎮張來播)

答：本省小粒種的落花生播下後，若有雨水滋潤，一星期左右就可發芽。種子發芽後三、四十天開花，再過六十天左右，就可以收穫。第一期應適期收穫，以免影響後作。

問：落花生下種後幾天可以收成？(苗栗縣後龍鎮張來播)

答：本省小粒種的落花生播下後，若有雨水滋潤，一星期左右就可發芽。種子發芽後三、四十天開花，再過六十天左右，就可以收穫。第一期應適期收穫，以免影響後作。

問：落花生下種後幾天可以收成？(苗栗縣後龍鎮張來播)

答：本省小粒種的落花生播下後，若有雨水滋潤，一星期左右就可發芽。種子發芽後三、四十天開花，再過六十天左右，就可以收穫。第一期應適期收穫，以免影響後作。

問：落花生下種後幾天可以收成？(苗栗縣後龍鎮張來播)

答：本省小粒種的落花生播下後，若有雨水滋潤，一星期左右就可發芽。種子發芽後三、四十天開花，再過六十天左右，就可以收穫。第一期應適期收穫，以免影響後作。

問：落花生下種後幾天可以收成？(苗栗縣後龍鎮張來播)

答：本省小粒種的落花生播下後，若有雨水滋潤，一星期左右就可發芽。種子發芽後三、四十天開花，再過六十天左右，就可以收穫。第一期應適期收穫，以免影響後作。

問：落花生下種後幾天可以收成？(苗栗縣後龍鎮張來播)

答：本省小粒種的落花生播下後，若有雨水滋潤，一星期左右就可發芽。種子發芽後三、四十天開花，再過六十天左右，就可以收穫。第一期應適期收穫，以免影響後作。

問：落花生下種後幾天可以收成？(苗栗縣後龍鎮張來播)

答：本省小粒種的落花生播下後，若有雨水滋潤，一星期左右就可發芽。種子發芽後三、四十天開花，再過六十天左右，就可以收穫。第一期應適期收穫，以免影響後作。

問：落花生下種後幾天可以收成？(苗栗縣後龍鎮張來播)

答：本省小粒種的落花生播下後，若有雨水滋潤，一星期左右就可發芽。種子發芽後三、四十天開花，再過六十天左右，就可以收穫。第一期應適期收穫，以免影響後作。

## 台灣各地都可種胡麻

問：我想在此地(東部)試種胡麻，不知是否可種？白胡麻種何處有售？(花蓮縣富里鄉陳朝枝)

答：胡麻在臺灣栽培以四一五月間播種最適。每公頃播種量九一二公斤。畦寬一公尺，行條播。發芽後每隔四十至五十公分行間拔。向日葵喜含有豐富有機質與氮肥的土壤，對於鹼性土壤的抵抗力也強。一般播種後，四個月就可以成熟。將葵花自花梗切下，經四至六天乾燥以後，以枷敲擊種子就能脫落。

## 向日葵的栽培價值

問：請問向日葵的栽培價值和種植方法？有人說用向日葵種子做雞的飼料效果良好，是否確實？(苗栗縣通霄鎮蕭寶炬)

答：向日葵在臺灣栽培以四一五月間播種最適。每公頃播種量九一二公斤。畦寬一公尺，行條播。發芽後每隔四十至五十公分行間拔。向日葵喜含有豐富有機質與氮肥的土壤，對於鹼性土壤的抵抗力也強。一般播種後，四個月就可以成熟。將葵花自花梗切下，經四至六天乾燥以後，以枷敲擊種子就能脫落。

## 落花生六十天可收穫

問：落花生下種後幾天可以收成？(苗栗縣後龍鎮張來播)

答：本省小粒種的落花生播下後，若有雨水滋潤，一星期左右就可發芽。種子發芽後三、四十天開花，再過六十天左右，就可以收穫。第一期應適期收穫，以免影響後作。

妙食外 榨的油 油有同 可以作 牛油等 常良好 濟原則 院康有




香蕉冬枯原的因 所到臺要 福原常

# 益隆農化工廠

榮譽出品 新強力綜合殺蟲劑 (山林農村園藝用)



立隆農大藥學 陳燭松先生推薦



## 犁頭有肥

耕田人就來說耕田話。句話，經我再三考慮的結果，有的犁具略為修整後，在自施。努力用犁頭耕翻土地(做，結果四三年第一期稻作，增加。第二期稻作，增加。只要我們耕地時，認真多耕(中耕)土地就是。深耕或耕翻可改良土壤，非常簡單，而且容易做。深耕可以幫助植物根系的蔓延，擴充作物吸收營養。深耕可以增加土壤對水分的保蓄力，有防止旱害。深耕可以增加土壤空氣的流通等等。改良土壤的物理性，促進各種成分的分解。耕翻可以改良土壤，種子發芽和根群伸展都很方便。耕翻可以使土壤中的肥分分布均勻。耕翻可以撲滅雜草和病蟲害。耕翻可以促進有用微生物的繁殖。以上利益可使稻作生育良好，增加稻谷生產。



問：我的魚池在去年五月起每天有三至五尾死亡，魚鱗脫落發生有疥癬狀的紅色物。請問這是否有魚蟲？我會更換池水並用藥處理，都不見效。（臺中縣沙鹿鎮蔡連賜）

### 預防魚類被病菌寄生

現出紅點，是因為水中病菌寄生於魚體。這病發生後很難治療，所以你的魚池應在春季未放魚前，充分消毒。你可用石灰二公升（二〇方公尺魚池）在排水後撒布於池底，並暴曬陽光經五、六天，以殺死病菌卵胞；注水後再經五、六天，才可以放魚。這樣就能預防了。（臺南水產試驗所曾梅檀）

### 魚池放養魚苗數量

每方公尺三尾為限

問：魚池面積約二十方公尺，養草魚鯉魚為主，共約三百五十尾。每年六月到九月之間，都有全部或一部浮上現象。過去是用生尿或糞散布維持，但是多少不免犧牲。這方法是否良好？（臺中縣沙鹿鎮蔡連賜）

答：按魚池面積二十方公尺可放魚苗限量（死水池）是六〇尾（每方公尺為三尾）

。所以放養過多在夏季一定會發生氧氣不足而浮頭，如果池中植物或植物性浮游生物繁殖得過多，就有全死的可能。你應該把放養尾數減少，或將池水改為流水。（曾梅檀）



### 土壤肥料

每天煮飯用蔗葉當燃料，燒剩的蔗葉灰用來施肥

在黏質壤土或細砂質壤土，請問，對土壤的改良和肥效怎樣？（臺南縣官田鄉陳伯連）

答：蔗葉灰的成份中大部分是碳酸鉀，也含有少量的磷酸鹽；對於土壤改良的作用很小。但不論施在黏質壤土或細砂質壤土，對於作物都有肥效。（省農業試驗所曾憲鼎）

### 水肥的消毒

注意肥效藥害

問：廁所的臭氣用克里蘇（クレゾール）解除，有沒有效果？其他有沒有特效藥品？但對肥份會損失麼？（臺南縣官田鄉陳伯連）

答：用甲酚（克里蘇，クレゾール）解除廁所臭味略有效果，但不能使用過多；如加在水肥中含量超過百分之三時，對於水稻施肥就有害處。其他如用石灰、蟻醛（福爾馬林）

、石碳酸等都有消毒解臭的效果；但消石灰會損失氮素，蟻醛和石碳酸也須注意濃度。（會憲鼎）（請參看本刊第三卷二十二期十頁「人糞尿消毒」）



### 蔬菜

於那種土壤？  
②在同一塊地和番茄分區栽種有無影響？（新竹縣竹北鄉陳才有）

答：①甜椒以土層深厚的砂質壤土或壤土最為適宜。生長期多雨的地區，更應選擇排水良好的土地，否則根部容易腐爛枯死；生長期乾燥而灌水不便的地方，不妨選用粘質壤土。  
②甜椒和番茄在同一時期種植並無影響，但如栽植有先後，則後栽的一種容易傳染病害。（鳳山熱帶園藝試驗所郁宗雄）

### 甜椒種子貯藏簡法

問：甜椒種子怎樣貯藏？（屏東縣萬丹鄉蔡坤喜）

答：甜椒種子（其他辣椒種子也是同樣情形）壽命比較短促，如果貯藏不得法，容易失去發芽力。例如把種子裝入紙袋或布袋中放置在室內，則大概經過一個濕熱的夏天，發芽率就很低，發芽的生長也不良，缺少實用價值。所以甜椒

種子應參照下面的方法貯藏：先把種子晒乾，然後把種子裝入乾燥的酒瓶內（種子少時宜用小瓶，總以滿瓶為佳），用軟木塞子塞緊瓶口，最好再用洋臘密封，把瓶放在陰涼的地方貯藏。（郁宗雄）

### 萊豆（皇帝豆）的採收貯藏簡法

問：萊豆的採種和貯藏方法怎樣？（臺南縣麻豆鎮王正雄）

答：萊豆的採種須待豆莢在莖上黃熟後才能採摘。採收時間宜在朝露乾後。採收後放在淺盤（如竹簍）中充分晒乾；然後剝出種子，再晒一、二日（避免強烈日照），就可以貯藏。貯藏宜用鐵皮罐（少量時可用餅乾空罐）；底層放置少許生石灰作乾燥劑，上鋪硬紙，然後把種子先裝入紙袋中再放入罐內，密蓋罐口，把罐放在陰涼乾燥處貯藏。貯藏期中每隔二、三個月檢查一次，如果塊狀的生石灰已風化成石灰粉，應另換新鮮的生石灰，務使罐內保持相當乾燥。（郁宗雄）

### 萊豆的播種和施肥

問：①怎樣使萊豆播種時能提高發芽率？  
②施用什麼肥料和施用時間怎樣？（麻豆鎮黃正雄）

答：①萊豆如播種過深或播種後土壤太濕，都容易腐爛

；如果土壤太乾，當然不容易發芽。所以播種時種子宜平置，種子上蓋土不要超過二公分，也不要淺過一公分，蓋土後再撒草木灰一把，有促進發芽和防腐爛防蟲蟻的作用。播種後澆水宜平勻，不可太濕或過乾，降雨時應注意排水良好。  
②肥料以用堆肥和過磷酸鈣、草木灰為主，都是作為基肥施用；糞尿水或是硫酸銨在播種後一個半月內分三次施完，以後可以不再施肥。（郁宗雄）

### 山東白菜根瘤病防治

問：山東白菜同一區內有一部份植株根部發育不佳，地上部的生長也不良，而又不結球，其原因和防除法怎樣？（雲林縣西螺鎮鎮藥）

答：你的山東白菜可能是患了根瘤病，有這病的山東白菜根部會發生瘤狀物（最初白色，後變褐色而軟化消失），細根減少，因此發育不良而不能結球。這種病在降雨時容易發生。防治法是：  
一、避免連作；  
二、避免在甘藍、蘿蔔、蕪菁或其他白菜類收穫的土地栽培；  
三、注意田間的排水保持良好；  
四、酸性土壤要施用石灰，中和土壤，每十公畝（一分地）約一百公斤左右。