

薤菜的貯水栽培

林進益

栽培薤菜

，應像秧田一樣整畦，畦寬四尺左右，畦溝一尺。畦整好後，再放水

薤菜（空心菜）的貯水栽培，或叫做水耕法，就是利用水田，長期淹水，以栽培薤菜。這是栽培薤菜的一種很好的辦法，因為：第一、管理費用和勞力較少，插苗後，只須補苗工作，以及注意排水、灌水即可，其他管理都不必要，病蟲害也少有發生。第二、因水份供應充足，枝葉繁茂，生長很快，產量頗高。

這種栽培薤菜的方法，是最近幾年來才興起的，農友們已經普遍採用。但有許多農友，以為栽培薤菜，是很容易的事，以致過份疏忽，下面幾點是應該特別注意的地方：

（一）需要肥沃的土壤

很多農友，往往選擇水稻生長不好的最壞的田地，用來種植薤菜。這種田地，土壤瘠薄，石礫瓦片很多，表土過淺，實在不適於種植薤菜。用水耕法栽培薤菜，應選土壤肥沃，富含有機質的田地，才可以使薤菜生長得旺盛，分枝強而葉子大。薤菜是葉菜類的一種，和一般葉菜類一樣，也是須要多量的氮肥，以及表土厚的壤土，才可以生長良好的。

（二）像秧田一樣的整畦

薤菜的收穫，並不像水稻一樣，一次就全部收成，而是分期採摘枝葉的。全面種植時如不預留空地，中央部份的採收，就不容易了。

插苗。平常可以全面灌溉（全部淹水），採收前，就把水田的水全部排除，採收的人，站在畦溝間採收，採收後再行放水，十分便利。

（三）多施用基肥

水耕栽培薤菜應多施用基肥，基肥用堆肥即可。施基肥時，應在耕耘整畦時，大量混入土中，以後即可免再施追肥。必需施追肥時，就施少許硫酸銨，而不必太多，施人糞尿做為追肥，是不衛生的。

（四）田水常常更換

有的農友，自薤菜插種以後，就把水淹滿，從來不再排水，經久田水不流動，即成死水。結果田水變惡臭，混濁不堪，對薤菜的生長很不利。應當每隔一星期，選天晴之日，放水一次，兩三天後再行放入新水，才不致影響薤菜的生長。

（五）適當的行株距離

種植薤菜最好的行株距離，是株距十五公分，行距三十公分。用這種行株距，將來成長後，株距間有空隙，一小行一小行，通風透光都很理想。

四月中旬至五月上旬，是最好的栽培適期。我相信各位農友，只要把上面五點注意到，一定能够收成好，增加收入。

（上接第六頁「輪流灌溉法」）

桃園大圳的第一支線第五號池，第十二支線第十七號池，海山水利會的十二股圳支線，新莊後村圳西盛支線，也設立有四個示範區，用五天灌水一次的方法，指導農民實施輪流灌溉。

實行輪流灌溉法，灌水的時間有一定，所以需要加強用水管理的工作。嘉南大圳區內，對於管理用水，除了管理會以下有分會、工作站外，農民本身還分



區範示灌漑流輪溪嵌樹大
會大立成站作工

有用水管理人二人。從放水到收穫為止，五十甲的灌水配水，都是由管理人公平辦理。這種雇用專任用水管理人的辦法，在嘉南大圳區內實行了幾年的結果，證明很合理想，其他各地可以參考採用。

更正

本刊五卷九期第十七頁，「本地種豬的比較和選擇」文內插圖，美濃種和雙溪種的兩張插圖的位置印錯了，原文圖中標題「美濃種母豬」，應該改為「雙溪種老年母豬」，原文標題「雙溪種老年母豬」，應該改為「美濃種母豬」，請農友們注意改正。