民國四十四年 七月份 農家月曆

水稻

北部：（基北區）一期作早熟種於六月下旬已開始收穫；中熟種於七月上旬開始收穫；晚熟種於七月中旬開始收穫。七月上、中旬二期作洗葉種，開始播種。第一期作本田，直接播期舉，（約當齊穗後廿天）田面可以完全排水。收穫時應實行低刈稻株，齊土刈刈。稻藁晾粒後，集中堆積，搬入牛糞及人糞尿，製作堆肥。

東部（蘇東區，花蓮區）：七月上、中旬一期作陸續收穫完畢。二期作陸續播種完畢。

中南部：①上旬播種，行盤中飽水式改良秧田（播床寬度四盤尺水溝一盤尺）。並行疏播，每坪六盤合左右（未浸水重約四盤兩）。即每甲需要一〇〇坪。

②番地秧田除施用十分腐熟堆肥（秧田一〇〇坪施用五〇〇盤斤）外，無需施化學肥料。利用水溝，調節灌溉或排水。插秧前七天左右，防治蝦蟆類或去種。

③第一期作本稻收穫跡地，立即耕犁並灌水，至插秧前三—四天，施用堆肥和化學肥料，實行全耕施肥，犁翻刈肥。插秧前天用手肥和機肥均勻田面。

④下旬為插秧適期，應正條密植（注意株行間七寸×八寸，在來八寸×八寸，每株支數四—五支）。

⑤保持淺水，並於十日內行第一次除草補植，未行全耕施肥的即行追肥。

甘蔗

北部：①新國注意除草追肥，並灌溉適時，酌行灌溉或排水。

②早植甘蔗下旬開始種植，注意整地並施基肥，每公頃堆肥一〇、〇〇〇盤斤；硫酸銨一六〇盤斤，過磷酸石灰一〇〇盤斤，氯化鉀六〇盤斤）土質輕鬆的地方小，肥質的離大。

中南部：注意排水，發芽後，即行補種，開始分蘗期接。六月播種的開始定苗，條播的株距為二四公分。點播的每穴留二株，應勤除雜草，培土，施用追肥，拔除病株，用DDT等藥劑防治蟲害。風雨後注意排水，培土，扶株。西部濱海地區及東部播種較早的，應完成中耕、除草、培土工作節以上時，摘去頂芽，隨時摘除旁枝嫩芽。

棉花

北部：西部採摘遲在本月播種定苗，發芽後，即行補種，開始分蘗期接。六月播種的開始定苗，條播的株距為二四公分。點播的每穴留二株，應勤除雜草，培土，施用追肥，拔除病株，用DDT等藥劑防治蟲害。風雨後注意排水，培土，扶株。西部濱海地區及東部播種較早的，應完成中耕、除草、培土工作節以上時，摘去頂芽，隨時摘除旁枝嫩芽。

苧麻

北部：收穫一水，生長正盛的，收穫二水。臨即施肥，中耕，除草，培土。栽種次年，臺北區收穫二水，施用追肥，中耕，除草。新竹臺南區中耕，除草，培土。栽種第二年以後：臺北、花蓮、臺中及高雄區，收穫二水後，新竹臺南區，收穫一水後，中耕，除草，施用堆肥。摘落蹤葉，撒覆蹤圃，並施化學肥料，並予培土。發生蟲害時，應噴射殺蟲劑防治。實生苗蹤葉的，勤除雜草，乾旱時應灌水濕潤。

黃麻

北部：高雄、臺東地區收穫中，中南部下旬亦開始收穫。收穫時多連根拔起。如係自用，或作給市場供應採用，宜剝製組葉，或作用麻方剝去表皮成為幼麻，再行晒乾時應留用。如預備給工廠公司織麻袋用，應製成精洗麻後，整理分級，成捆運往收購處出售。沒水期間，應防纖維曝露水面，或與池側泥土接觸。其他地區，乾時應予灌溉，有立枯病或炭疽病發生時，拔除病株燒掉。發生白絹病或根腐病時，拔除病株燒掉後，並撒佈石灰及石灰。

落花生

果莢漸脫粒。留種用的宜用手剝，選取莊全飽滿種實。採油食用的可用機器脫殼。東部第二期作蔗地，宜施用堆肥，過磷酸鈣等作為基肥。中、下旬開始播種，可用牛犁。開條溝播種，行距三〇—四五公分，每穴點播種子四—五粒，每公頃約需種子七二—九〇公升。

茶

北部：①第二次夏茶開始，月中採刈後，採人茶園行間（菁芳豆，製地豆，綠豆等雜地一尺刈取）。③北部第一次夏茶後，學行第二次中耕除草，壓條苗圃特別注意培土。④臨時清溝溝渠。⑤臨時摘除茶餅病病葉。避低濕、象鼻蟲可能發生，應用捕捉、剪枝或燒煙蟲等法。

中南部：①完成春茶後的中耕，除草，施肥。②清理排水溝。③乾旱茶園幼木園，注意灌土，減少旱害。④二、三年生茶樹，可酌行摘心。茶蟲及茶毛蟲可用魚藤酮乳劑三〇〇—三五〇倍的稀釋液噴殺，茶幾茶蟲也可用魚藤乳劑噴殺，惟於噴射藥劑時應用竹棍打動茶樹，使撲藥葉幼蟲露出。⑤中部阿薩姆茶區，特別注意茶餅病的發生。⑥繼續採摘及製造。

菸草

①本月須注意種菸用的堆肥，並對使用純淨的稻草堆製。絕對避免混有菸草和紫菀輪作作物的殘葉爛葉。②準備苗床堆肥，常常翻動，使充分腐熟。③稻菸間作的，應於第二期水稻插秧前，把行距株距排水溝方向等，早作規劃。

鳳梨

①番和鳳梨開第六次中耕除草。②鳳梨採摘適宜本月播種，以供秋季採苗繁殖。③本月中下旬是開英種夏果盛出期。④凡是後選採上的冠芽，應該在採收果實時切下，倒立地上，晒乾切口，就地假植。⑤施肥，每千株應硫酸銨二三—六公斤。⑥準備秋植的鳳梨園，如已種植絲肥，應在本月份把絲肥耕犁入土。

番木瓜

①中耕除草一次。②南部雨季開始，如有積水，應立刻開溝排去。③結果過多時宜行疏果：除去一部分小果。④育苗苗前兩回，五公分時移植一次：㊀移植床：土宜疏軟肥沃，排水良好。㊁選陰天或傍晚時移植。㊂苗距二〇—三〇公分。㊃移植後如晴天，要設法遮陰保護。㊄活苗後應施稀薄液肥二、三次，每星期一次。

柑橘

①捕殺大牛：被毒殺它的幼蟲。②應刈草一次或用牛作淺耕犁，把雜草翻入土中。如已種綠肥，應刈割綠肥一次。③柑橘類夏季修剪：㊀凡是不損傷利用它去補充損失的主枝的徒長枝，應趁早剪除。㊁檬檬新梢留十葉摘心，促使分枝。㊂剪除纖弱枝和密生枝。④注意蚧枝不可隨便剪短。

附註：本月採收龍眼、荔枝、八仙果、檬果、蜜西瓜茶蘇梨。

蔬菜

一、栽種可以播種的種類如下：①平地直播：豆菁（北部）；芹菜（北）；黃瓜（北）；「立秋」「四葉」等品種，

四瓜（南部七月下旬播）；其他可播的種類和六月份相同。②平地床播：甘藍「本地種」（中北部），花椰菜「本地早生」，芋頭，黃秋葵。③高冷地直播：甘藍（北部除本地種，中南部各品種），卷心萵苣，花椰菜「本地中生」，番茄。

二、栽種管理

①北蔥、大蒜、韭菜和六月床播的種類，栽植到本圃。

②平地甘藍、花椰菜苗床，日中遮蔭，遮免強光直射。

③芫荽，芹菜等，如有日光直射，加蓋蓆子等遮蔭。

④瓜類果形大的種類幼果套袋，以防瓜實蠅蟲恥為害。

養牛

康克利（カンクレージ KANKREI）種及幸度（シンドSIND）種已度牛，在這時期配種，最易受胎。去年九、十月間配種受胎的水牛，本月內即可分娩，管理應加注意。在配種時期的種公牛，須補給足量的蛋白質飼料，很切忌飼育過肥。注意驅除蚊、蠅、牛蝨，在烈日下長時間工作。

養猪

猪舍應使充分通風，保持清潔，飼料乾燥，並常打掃而易於消化的飼料。注意給與清潔飲水。每日在早晚飼料的時間，給予適當的運動。並行水浴。按時施行預防注射。

養鷄

鷄舍應充分通風，在這時期內兩週，雞糞清除一次。飲水可用井水或飲命的清水，一日更換三回。給與富於營養分的飼料。應稍乾硬，且分數次少量給與。飼料中鮮魚可改換用魚粉。青飼料應適量給與。施行預防注射，病鷄須從速隔離消滅。

國曆七月	農曆五月	星期	氣節和紀念日	記事
1	十二	五		
2	十三	六	國際合作節	
3	十四	日		
4	十五	一		
5	十六	二		
6	十七	三		
7	十八	四	陸軍節	
8	十九	五	小暑	
9	二十	六		
10	廿一	日		
11	廿二	一		
12	廿三	二		
13	廿四	三		
14	廿五	四		
15	廿六	五		
16	廿七	六		
17	廿八	日		
18	廿九	一		
19	六月初一	二		
20	初二	三		
21	初三	四		
22	初四	五		
23	初五	六	大暑	
24	初六	日		
25	初七	一		
26	初八	二		
27	初九	三		
28	初十	四		
29	十一	五		
30	十二	六		
31	十三	日		