



(臨城縣) 景風近附水門石

年豐

年四十四國民華中
曆月家農份月八

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	八月
廿八	廿七	廿六	廿五	廿四	廿三	廿二	廿一	二十	十九	十八	十七	十六	十五	十四	農曆
一	六	五	四	三	二	一	(廿一) 立秋	日	六	五	四	三	二	一	期星
事															
31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
十四	十三	十二	十一	初十	初九	初八	初七	初六	初五	初四	初三	初二	初一	三十	廿九
三	二	一	日	六	五	四	三	二	一	日	六	五	四	三	二

北區：(蘇北區) 二期作插秧，自七月中下旬開始，最遲不過八月八日(立秋節)。在來種全生育期間較長，秧田日數可較長(一個月)，拔秧時把秧苗頂部截去五、六寸。

甘薯

甘薯：依照各地情形加以中間整地，壟寬約三、三。

芋麻

芋麻：(一)北中和中區整地新栽，每畝(二)去春栽種的，北部收種三、去春栽種的，北部收種三、去春栽種的，北部收種三、

棉

棉：(一)吸枝繁殖的(二)北中和中區整地新栽，每畝(三)去春栽種的，北部收種三、去春栽種的，北部收種三、

茶

茶：(一)幼齡茶樹，應注意鬆土，以防旱害。(二)茶葉將採收時，可以液噴殺除蟲(葉衣蟲)及葉蟎。夏茶採收後，應立即進行修剪。夏茶採收後，應立即進行修剪。

易於成活。蓬萊植適於利用幼秧，秧期十三天即足，仍用鑽秧法。
②中耕除草：插秧後一星期，舉行第一次中耕除草，以後每隔一星期除草一次，最多三次。
③肥料：無論基肥及追肥，蓬萊植可照一期作標準；在來種施用第一期作標準之半量。第一次中耕除草同時，施用追肥。
東部：(蘇東區、花連區)七月底以前插秧完畢，八月份起中耕除草二、三次，第一次中耕除草，同時施用追肥。
中南部：①插種：插秧後五、七天及早實行。
②除草：第一次在插秧後第八到第十天，以後每隔十天進行第二、三次。第一次略排除雜草，第二次，助長下部分蘗，至第三次再把株間土壤堆集株下，防止後中期無效分蘗過多。
③追肥：插秧前，殘餘的肥料，第一次除草前和土壤攪拌混勻後施下，最晚在第二次除草前施用。
④一般管理：至插秧後二星期左右儘量維持淺水，注意防治滋害。插秧後蓬萊種約三、三五天，至田面散生草葉為止。

萬畝左右，剪麥採兩節之程度。
③肥料：鉀肥及堆肥儘量多用。
④一般管理：過乾時應酌量澆水，隨時中耕除草。如扦插肥料未用足量，可將舊腹股開溝補施。
(一)四四一四五
年秋植甘蔗注意排水，防止滋害。
(二)四四一四五年期宿根甘蔗及春植甘蔗，注意排水，行大培土，培土高度二五、三十公分。
(三)四四一四五年期秋植甘蔗：①月周、南投、玉井地區應注意澆水，補種，排水，除草，本月上旬務須澆水完畢。
②臺中(平地)，溪湖，虎尾，北港，龍巖，斗六，大林等地區，本月份為主要植期，開行以後應在底較之前，施用BHC殺蟲藥劑，預防地下害蟲。
BHC殺蟲藥劑，預防地下害蟲。另注意澆水，補種及排水。
③新營總區：預定本月下旬植蔗的，本月上旬即需澆水完畢。中下旬應澆水。預定本月上旬亦需澆水。本月下旬播種的，應完成中耕除草工作，同時把行間土壤，培在植株根

草，施用追肥，兩期注意排水。
①各地收穫中，宜在盛花後三四星期，花葉散落，期果形成之時收穫，製造纖維。如係自用，或售給市場製糖用，宜製成粗纖維或幼麻，須連根拔起，如須製成粗纖維，就要沤泥須取，製造精洗麻。
②大量留種的，應在盛田刈除分枝後，或不健全纖維麻。自家少量留種，應在收穫纖維時，剪取分枝少而高之健全優良麻株，離頂端五〇公分左右的頂端，扦插於水田壟旁或苗床，供採種之用。
③第一期作(春作)：北部地區及高雄花連澎湖等高地應注意澆水，乾燥脫殼，選留健全飽滿種子，供第二期作(秋作)之用。
④第二期作(秋作)：在前作收穫後，就要深耕整地播種。
北區：①幼齡茶樹，應注意鬆土，以防旱害。
②茶葉將採收時，可以液噴殺除蟲(葉衣蟲)及葉蟎。夏茶採收後，應立即進行修剪。夏茶採收後，應立即進行修剪。

柑橘 ①繼續補殺天牛，並毒殺其幼蟲(柚類)。②檢拾落果，深埋或埋掉，以殺死果實幼蟲。附註：①採收梨果、人心果、龍眼、西印度鳳梨等。②番木瓜幼苗，移植床培養一月，即可定植。
①直播的：蘿荷「美豐生」群，「仔仔」群，「棧仔」群，「大白瓜」群，「櫻桃」群，「多」群，胡蘿蔔(北部)，豆薯，牛蒡，大蔥，蓮(北部)，白菜「鳳山白菜」，「南港白菜」，「黃金白菜」等，高薯「本地種」，芥藍(下旬起可用來播)，大芥菜「牛蒡甲」(密植)，茼蒿和芥菜「本地種」(高冷地)，茼蒿和芥菜「本地種」(高冷地)，茼蒿和芥菜「本地種」(高冷地)。(最好在雙午有遮蔭)，蘿菜(亦可扦插繁殖)，番香，分葱，胡瓜「立秋」，「餘時」，「本地花瓜」等。「花連西瓜」群，「成敬」，「甜瓜」黃香瓜「群」，「成敬」，「青甜瓜」等，洋甜瓜「(Rokoy)等(限南部但澎湖除外)，冬瓜，葫瓜，扁蒲，南瓜，西瓜及瓜子西瓜，苦瓜，菜豆(北部)，紅豆，菜豆(高冷地)，黃秋葵。
②採播的：球莖甘藍，李薺，石刁柏(播約九個月)，洋蔥(八月中旬起)，大蒜，卷心白菜「本地種」(北部)，甘藍「本地地早生種」，芥菜「本地地(播約三個月)」，花椰菜「本地地(播約三個月)」，意大利甘藍，番薯(北部)起，中南部中起，辣椒及胡椒。
③七月份播種的種，約經一個月苗期到田間；④九條菊，西線菊，韭菜和金針菜用分株繁殖法栽種；⑤今春播種的北薯苗，可栽種；⑥用種用種薯。
養牛 本月起至明年二月起，發情的水牛，可照配種或受孕的印度種水牛，此時再配種，仍易受孕。去年十月間配種受胎的水牛，本月內即將分娩，應加注意。破舊的畜舍，應從速修理，以防風濕損害，發生意外。
養豬 年初開始飼育的豬，設法脫售，如繁殖母豬，給與適量的抗生藥及維他命等補劑飼料。如分娩的乳豬，注射抗生素，離乳後，給與抗生藥及維他命等補劑飼料，有促進生長的效果。常行沐浴，舍內經常保持乾燥清潔。
養雞 中雞飼養，切忌乾燥清潔，舍內經常保持乾燥清潔。給予適當的運動場所。用DDT除蚊蚋。雞雛要驅除蛔蟲，並給與適當的飼料。產卵時，多給食，可將平時產卵或成績不良的雞淘汰。七月以前即已換毛的，半為產蛋雞，亦可淘汰。舍內整人開出入，按期施行預防注射。

夏季預防傳染病應注意的事

- ①趕快到附近衛生院所接受預防注射。
- ②飲水一定要煮沸。
- ③不吃生冷食物。
- ④不吃蒼蠅爬過或已腐壞不新鮮的食物。
- ⑤住所和水溝保持清潔與通暢。
- ⑥衣服、被褥等常常洗滌。
- ⑦吃飯以前，大小便後，一定要洗手。
- ⑧家裡病人用過的用具，必須經過煮蒸，或用藥水洗滌後，才能使用。
- ⑨盡量避免去有傳染病流行的區域，並不在病區的河流，海邊洗澡或游泳。
- ⑩發現傳染病(或疑似)的患者，馬上通知衛生院(所)，以便接洽病院治療，並可予以消毒。