



南部二期作

番茄糊仔栽培

嘉義縣民雄鄉農友 劉海清

本省市場最受歡迎的番茄品種，是果形近似球形，中等至中大形，紅色，褶皺少而淡的，具有上述情形外，並且對病害抵抗強的品種，如 Break O' Day, Pritchard, Marglobe 等，都很適宜。

播種時期，以水稻抽穗前兩天，就是稻穗包在葉內豐滿時最適合。

播種用苗床，播後輕覆腐熟的鬆散堆肥和草木灰，並充分澆水。

發芽前早晚澆水，經三日後就會發芽，立即除去蘆草，發芽後每日早晨澆水一次。

每一分地播優良種子（發芽率一〇〇%）約十二公分。

播種後約經二十五日左右，稻穗谷粒飽滿時，可以移植。

株距一·五——二·五尺，行距以每五行水稻為一畦，約三·五——五尺，每一分地約植一三二〇株。

栽植時水田應提前一天澆水，至全田均勻為度，經半天排水後就可栽植。先用長六·五尺桿二枝拿於雙手，每隔五行壓稻株傾斜，拔苗前苗床須充分澆水。約二十分鐘後，用手輕輕拔起苗株，避免傷及根部。拔後放在糞糞運至田地栽植，用手指掘一植穴，每穴植一株，不可彎曲主根。

植後經二天，若有缺株，應行補植。每一分地的施肥標準如下表（單位：臺斤）：

第一次	第二次	第三次	總量
100	100	100	300
5	5	5	15
10	10	10	30
5	5	5	15
5	5	5	15

第一次追肥在移植後一星期施下，肥料混合後施於株傍約二寸處，其上再覆堆肥。

第二次在水稻收穫後，培土前施下。第三次在定植後五十至六十日，用鋤在植株邊約三寸半處開穴施下，再行覆土。

水稻收穫完畢，第二次施肥後，用犁犁起兩側二行。壟土（土地）不可破碎，用手並列作成粗骨畦形，再犁起畦邊的土，十日後用鋤破碎土塊，行中耕培土。

遇有連日下雨，應注意排水工作。若有久旱不雨，即施行澆水。以外要注意病蟲害的防治。

種子 是 農 業 生 產 的 生 命

美國巴比公司產種子入貨了！

（洋蔥鐵罐一磅裝）

◎洋蔥種子（E_G 球型 B 扁型），胡蘿蔔

（美國大五寸、美國紅心五寸）、加州大甜椒、結球高苜、露地香瓜。

花椰菜最高權威

◎喜樹早生、興農晚生巨大花椰菜

◎三池中生甘藍、金澤結頭菜、美濃

早生大根、丸葉山東白菜等。

函詢即能得到詳細的說明！



看附圖內新到各品
知函索即寄
元函索即寄
容函索即寄
種函索即寄
培函索即寄
法函索即寄
藍函索即寄
農函索即寄
藥函索即寄

總輸入元 德盛貿易行

興農種子行

臺北縣三重鎮重新路1段48號 電話45332號

本行專營

國內外蔬菜種子、品種確保

優良、價格低廉供應：

美國洋蔥扁型、美國人參大二三寸

美國各種高苜菜、美國結頭菜

彰浦包心白菜、南畔州早菜頭

北京結頭菜、日產各種白菜

日產各種菜頭、長岡交配一號甘藍

三池中生甘藍、金澤粗蘭結頭菜

其他各種種子、農藥均齊備

，應有盡有不論多寡均聽尊便，歡迎光顧。

合成種子行

臺北市迪化街1段215號

電話43323號

分銷處 四海種子行

嘉義市民族路538號