

# 種採的萄蘿



郁文陳

蘿葡(菜頭)的採種法，通常有三種，現在分別說明如下：

## 一、母本採種法

(1)選擇採種母本：在普通的蘿葡田裏，選擇具有品種特性的優良個體，作為採種的母本。選擇工作，可和採收工作兼行，但是拔取採種母體的個體時，不宜損傷。選出的個體，切去莖端，葉部約留十二公分，然後搬入蔭涼的地方，放置二、三天。

(2)定植準備：栽植地要選擇日光充足，通風良好，沒有他品種的蘿葡或十字花科蔬菜栽培的場所。土質以排水良好的砂質壤土，最為適宜。整地作高畦，畦溝約一〇〇公分，株距約六〇公分，一分地的栽植株數約一、三〇〇株。基肥施在植穴的兩側，栽植前根部如有擦傷，可用草木灰或硫黃粉消毒。

(3)定植：定植宜在下午施行，把蘿葡的根部傾斜埋下，深約根長的三分之二左右，注意不可使

根部觸及基肥。植後的灌水不可過多，土壤過濕時，不可定植。(參看附圖)


(4)管理和採收：定植後經常注意防治病蟲害。追肥約在定植廿日後施用。開花後須設支柱，以防止花枝的倒伏。種莢十分黃熟時，用刀刈收，一株的採種量，約三与左右。

## 二、直播採種法

直播採種用的種子，須要確實優良的純種。適宜的播種期，中北部為九月至十月，南部為十月至十一月。播種作高畦，畦溝約八〇公分，株間約五〇公分。播種用點播法，每一穴播種子五、六粒，一分地的所需種子量約三、四合。發芽後約十日，行第一次間拔，每一植穴留二株。再過十日行第二次間拔，每一植穴只留具有品種特性的優良苗一株。間拔後的管理，和普通栽培一樣。

## 三、低溫處理採種法

普通在平地抽苔採種困難的品種(如日本的美濃早生，聖護院等)，都可用低溫處理的方法採種，這是鳳山熱帶園藝試驗分所試驗成功的。採種用的種子，須要確實優良的純種。採種時，先把種子放在碟內「催芽」。種子微有發芽後，立即放入攝氏三度以上八度以下的水箱內



# 請用明星花露水

明星爽身粉

明星滴滴嬌

明星檀香粉



明星香皂廠出品  
臺北市博愛路一三六號  
電話：二五三〇〇

，低溫處理。低溫處理中的溫度，須要固定不變，處理中注意不可使幼根乾燥，乾燥時就要注水保持濕潤。廿日後，幼苗取出，移植在預先準備好的床地。植距和直播採種法相同。移植後，日間須要設備覆蓋遮蔭二、三日，移植到抽苔約需廿日，管理方法都和直播採種法相同。經低溫處理的蘿葡，抽苔開花時，根部並不肥大。但採得種子的品質和生產力，和普通採種方法所得的種子一樣優美。

## 四、施肥量舉例

蘿葡採種的肥料，須要比普通栽培多施磷肥和鉀肥，下面是一分地的理想施肥量：  
(1)基肥：堆肥一、五〇〇公斤，草木灰一〇〇公斤，過磷酸鈣四〇公斤，人糞尿八〇〇公斤。  
(2)追肥：硫酸銨(硫安)三〇公斤，過磷酸鈣三〇公斤，硫酸鉀一八公斤(分三次施用)。