農友經驗

全年抽花的「年花韮菜」

彰化縣溪湖鎮　楊昌坤

韮菜花是很受歡迎的一種蔬菜，但是出產的季節很短，一年只有兩三個月，其他的時間，只能出售韮菜葉，價格很低。彰化縣溪湖鎮汴頭里的農友，栽培一種「年花韮菜」，全年可以抽花採收，很有利益。汴頭里六六號的楊猪江先生，在縣政府農林課服務，對於蔬菜栽培，很有研究。公餘之暇，他在家中經營菜園，對於「年花韮菜」，更特別發生興趣。

「年花韮菜」和普通韮菜極易識別，普通韮菜由一母枝一年中可抽三至六枝花梗，「年花韮菜」一年中可抽廿五至卅五枝之多。「年花韮菜」比一般韮菜，葉狹細，且帶濃綠色，葉尖四時豎直，花梗形成三角狀，花蕾瘦弱，花苞帶淡綠色。因為花蕾鬆瘦而花苞帶綠色，迎合市場需要，因此價錢比普通品可高二成甚至五成。普通韮菜摘收花梗後，須經三天以上纔能抽苔，但「年花韮菜」在花梗可收時，葉梢間已露出幼花苞。

楊猪江（右）和鎮農會李總幹事在菜園中

現在遠近農友聞悉，紛紛到該鎮參觀，楊猪江先生的韮菜花園內並備有粗盆十數只，專供遠方農友採運樣本去種植的。

猪飼料甘藷儲藏新法

彰化縣竹塘鄉　詹德敦

甘藷的貯藏，通常是採用日晒乾燥法，和新鮮甘藷藏法，這兩種方法都有缺點。我有一種簡便儲藏新法，貯藏很久品質也不會變壞，無論何時何地都可以儲藏。

甘藷晒乾後，切成小塊或磨成簽，裝入磁缸內。裝入時分層放入，缸底先撒佈米糠，其次放甘藷塊一層，其次再撒佈米糠和食鹽，如此一層一層裝下去，最上面用多量的米糠食鹽蓋上面。裝滿後缸口蓋掩緊密，以粘土和石灰封固，使空氣不能流通。經過四十天就可以開放，此時成為熟爛，稍有酒味的香氣能促進猪的食慾，成為一種良好的飼料。

我使用鉀肥經驗

一　臺南縣下營鄉　洪天輝

去年我種二塊黃麻，其中一塊用鉀肥二十公斤，一塊沒用，面積各為一分地，其收穫成績如下。

甲、施鉀肥區（硫酸鉀二十公斤）收粗麻六五〇公斤。

乙、無施鉀肥區　收粗麻四五二公斤。

由上面的成績可知施用了二十公斤硫酸鉀，可增收粗麻一九八公斤，這利潤是當大的。

二　臺南縣新化鎮　廖昆安

我於四三年，選定〇・二公頃鳳梨園，劃為兩區，面積各為〇・一公頃，一區為無鉀區，一區施鉀區，施用量為十五公斤，其中三分之二做基肥，三分之一做追肥，基肥部份穴施，追肥部份在株側挖穴和土施用，結果成績，如後：

區別	株數（株）	收量（公斤）	備考
有鉀區	一、一〇〇	一、四五二	果實充實，果肉多
無鉀區	一、一〇〇	一、二五四	果肉少

由此可見鉀肥確能使果實充滿，增進品質。

三　彰化縣新港鄉　周添丁

我曾把蒜頭田，分為二小區，一小區施鉀肥，另一小區單用堆肥，均於整地時將肥料撒於土表，然後耕耘，使肥料與土壤均勻混合，而後作畦播種，結果在發芽至結實之間，生育狀態看不出有何差異，但在結球後忽然遇到數天大雨，雨後兩小區卽顯示很大差異，鉀肥區照常生長，不受任何損害，無鉀區卽停止發育，葉尖至莖部漸次開始萎凋而枯乾，在收穫後比較起來，鉀肥區之蒜頭形狀粗大，熟度足，果實充實而有光澤，甚美觀，無施鉀肥者形狀小，熟度不足，不堅實，又沒光澤，其收量有鉀肥區較無鉀肥區多收百分之三十左右。從此實地經驗，我始瞭解鉀肥之效果，確認鉀肥是固根强枝肥料，是各種作物不可缺之肥料。

四　嘉義市保安里　蕭浩志

我種菜豆一分地，舊曆元月下種，在發芽二十日就施用水肥，等水肥晒乾後，再施用鉀肥四十臺斤，然後壅土，附近有農友亦種了一區菜豆，面積約二分地，他也同樣用水肥，可是沒有用鉀肥，而加用七十臺斤硫銨，長大以後，我的菜豆株株堅强結實，無蟲害，黑脚病也沒有，隔壁的菜豆，因單用硫銨，莖葉生長過茂，致招受了蚜蟲，金龜等蟲害，加上了許多次噴射藥品驅除害蟲工作的麻煩，在三月下旬開始收穫，我的菜豆比他的又長又大，又充實，又美觀，收量又多了隣家的菜豆收到五月初就收完了，結果二分地共收二千四百臺斤，我的有用鉀肥的菜豆一直長至五月中旬，多採收二十日之多，結果我的一分地共收了一千六百臺斤，平均起來，我的一分地菜豆比隣家的多收了四百臺斤，亦卽多收了新臺幣四百元，鉀肥就有這樣的效果，實在值得我們注意。

廣告

這次徵稿，承各地農友紛紛應徵，現在已經接到很多的寶貴經驗，實在使我們萬分興奮，但是因為限於篇幅，來稿僅將經驗成績照原稿刊登，容陸續在本欄內發表。

化學肥料服務社啓