營友經驗

全年抽花的「年花韭菜」

彰化縣溪湖鎮 楊昌坤

韭菜花是很受歡迎的一種蔬菜，但是出產的季節很短，一年只有兩三個月，其他的時間，只能出售韭菜葉，價格很低。彰化縣溪湖鎮汴頭里的農友，栽培一種「年花韭菜」，全年可以抽花採收，很有利益。汴頭里六六號的楊猪江先生，在縣政府農林課服務，對於蔬菜栽培，很有研究。公餘之暇，他在家中經營菜園，對於「年花韭菜」，更特別發生興趣。

「年花韭菜」和普通韭菜極易識別，普通韭菜由一母枝一年中可抽三至六枝花梗，「年花韭菜」一年中可抽廿五至卅五枝之多。「年花韭菜」比一般韭菜，葉狹細，且帶濃綠色，葉尖四時竪直，花梗形成三角狀，花蕾瘦弱，花苞帶淡綠色。因爲花蕾鬆瘦而花苞帶綠色，迎合市場需要，因此價錢比普通品可高二成甚至五成。普通韭菜摘收花梗後，須經三天以上纔能抽苔，但「年花韭菜」在花梗可收時，葉梢間已露出幼花苞。

楊猪江(右)和鎮農會李總幹事在菜園中

現在遠近農友聞悉，紛紛到該鎮參觀，楊猪江先生的韭菜花園內並備有粗盆十數只，專供遠方農友採運樣本去種植的。

猪飼料甘藷儲藏新法

彰化縣竹塘鄉 詹德敦

甘藷的貯藏，通常是採用日晒乾燥法，和新鮮甘藷藏法，這兩種方法都有缺點。我有一種簡便儲藏新法，貯藏很久品質也不會變壞，無論何時何地都可以儲藏。

甘藷晒乾後，切成小塊或磨成簽，裝入磁缸內。裝入時分層放入，缸底先撒佈米糠，其次放甘藷塊一層，其次再撒佈米糠和食鹽，如此一層一層裝下去，最上面用多量的米糠食鹽蓋上面。裝滿後缸口蓋掩緊密，以粘土和石灰封固，使空氣不能流通。經過四十天就可以開放，此時成爲熟爛，稍有酒味的香氣能促進猪的食慾，成爲一種良好的飼料。

我使用鉀肥經驗

一

臺南縣下營鄉 洪天輝

去年我種二塊黃麻，其中一塊用鉀肥二十公斤，一塊沒用，面積各爲一分地，其收穫成績如下。

甲、施鉀肥區（硫酸鉀二十公斤）收粗麻六五〇公斤。

乙、無施鉀肥區　收粗麻四五二公斤。

由上面的成績可知施用了二十公斤硫酸鉀，可增收粗麻一九八公斤，這利潤是當大的。

二

臺南縣新化鎮 廖昆安

我於四三年，選定〇・二公頃鳳梨園，劃爲兩區，面積各爲〇・〇五公頃，一區爲無鉀區，一區施鉀區，施用量爲十五公斤，其中三分之一做基肥，三分之二做追肥，基肥部份穴施，追肥部份在株側挖穴和土施用，結果成績，如後：

區別	株數（株）	收量（公斤）	備考
有鉀區	一、二〇〇	一、四五二	果實充實，果肉多
無鉀區	一、二〇〇	一、一五四	果肉少

由此可見鉀肥確能使果實充滿，增進品質。

三

彰化縣新港鄉 周添丁

認無，比何然播於
鉀鉀無較損遇種整
肥肥施起害到，地我
是區鉀來，數結時曾
固多肥，無天果將把
根收者鉀鉀大在肥蒜
強百形肥區雨發料頭
枝分狀區卽，芽撒田
肥之小之停雨至於，
料三，蒜止後結土分
，十熟頭發兩實表爲
是左度形育小之，二
各右不狀，區間然小
種。足粗葉卽，後區
作從，大尖顯生耕，
物此不，至示育耘一
不實堅熟莖很狀，小
可地實度部大態使區
缺經，足漸差看肥施
之驗又，次異不料鉀
肥，沒果開，出與肥
料我光實始鉀有土，
。始澤充萎肥何攪另
瞭，實凋區差均一
解其而而照異勻小
鉀收有枯常，混區
肥量光乾生但合單
之有澤，長在，用
效鉀，在，結而堆
果肥甚收不球後肥
，區美穫受後作，
確較觀後任忽哇均

四

嘉義市保安里 蕭浩志

鉀，旬了的多豆，面晒
肥我，，又次，長積乾
就的多結長噴因大約後我
有一採果又射單以二，種
這分收二大藥用後分再菜
樣地二分，品硫，地施豆
的菜十地又驅鋑我，用一
效豆日共充除，的他鉀分
果比之收實害莖菜也肥地
，隣多二，蟲葉豆同四，
實家，千又工生株樣十舊
在的結四美作長株用臺曆
值多果百觀的過堅水斤元
得收我臺，麻茂強肥，月
我了的斤收煩，結，然下
們四一，量，致實可後種
注百分我又在招，是蒐，
意臺地的多三受無沒土在
。斤共有，月了蟲有，發
，收用隣下蚜害用附芽
亦了鉀家旬蟲，鉀近二
卽一肥的開，黑肥有十
多千的菜始金脚，農日
收六菜豆收龜病而友就
了百豆收穫等也加亦施
新臺一到，蟲沒用種用
臺斤直五我害有七了水
幣，長月的，，十一肥
四平至初菜加隔臺區，
百均五就豆上壁斤菜等
元起月收比了的硫豆水
，來中完他許菜鋑，肥

這次徵稿，承各地農友紛紛應徵，現在已經接到很多的寶貴經驗，實在使我們萬分興奮，但是因爲限於篇幅，來稿僅將經驗成績照原稿刊登，容陸續在本欄內發表。

化學肥料服務社啓

廣告