

Figure 2 consists of three black and white line drawings illustrating different methods of grafting stone nuts onto a wooden log. The left drawing shows a stone nut being inserted into a hole in a log. The middle drawing shows a stone nut being inserted into a hole in a log, with a small arrow indicating the direction of insertion. The right drawing shows a stone nut being inserted into a hole in a log, with a small arrow indicating the direction of insertion. Below the drawings is the caption '二圖 番石榴接芽法'.

如何改良番石榴的品質

公尺以上的枝條
宜行剪去，以免
樹形過高。剪去
上枝可以促進下

（續上期）

三、適當

嫁接的成活率可達百分之七十至八十，成活後經小心管理，生長滿一年，即可定植於本園。株行距均以五公尺爲宜，最少亦需四公尺（每公頃六二五株）。定植後一年，即可開花結實。

四、管理的要點

(1) 整枝修剪 幼苗株條三〇至四〇公分以下萌發的新芽，都要除去，使成單幹，在其上留新枝三至四枝斜向上方，形成主枝。各主枝長六〇公分左右時，實行修剪，使形成「杯狀樹形」。每年於冬季修剪一次，剪去枯枝及老弱枝。高過三、四

枝不定芽的萌芽，使保持一定的高度及樹形，主幹近地處發生的芽，也要除去。

(2) 蟲害的防治 注意防治吹綿介殼蟲，圓褐介殼蟲及天牛，參看本刊各期刊載的防治方法。

(3) 施肥 地力中等的土地，七、八年生的樹，每株每年的施肥量舉例如次：堆肥二〇公斤，豆餅八〇〇公分，過磷酸石灰六〇〇公分，草木灰一公斤，早春時在樹的四週施下。結果二〇年以上的老樹，如樹勢已弱，應行更新一次。冬季春季之間，剪去上部枝條，只留主枝，加施上述肥料的一倍，使春間萌發多數新枝，然後選留強健的枝條，這樣可以恢復結果的能力。

洋蔥葉枯病、腐敗病等一切病害特效藥

△最新超強力殺蟲劑（滅除一切害蟲）
裕米農乳劑・錠劑・石灰

△野鼠用最強力殺鼠劑 △有利的

鼠拉倒爾
西洋松茸菌絲

◎優良蔬菜種子

△美國洋蔥
△美國胡蘿蔔
△美國露地香瓜
△美國落茄
△美國加州大柑椒
△美國各種莖菜
△美國各種莖菜(チンヤ)
△美國早生兼用花椰菜
△其他各種夏秋種子、農具、農藥、捕魚網均有
「商品目錄或說明書」附郵票四角即寄

全省唯一專營農業生產資材貿易商
臺灣農產企業公司
臺北市迪化街一段二五六號
郵政劃儲臺灣一五九三：電話：四四二五三
臺中縣經銷處：原豐鎮春富街五五號
陳昂商行
彰化縣經銷處：湖光鎮華光一號
華美商行

(9)